早酥红梨基地、早酥红梨树苗种植管理

产品名称	早酥红梨基地、早酥红梨树苗种植管理
公司名称	泰安开发区林泽园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	公司:林泽农业 粗度:1 根系:30
公司地址	山东 泰安市岱岳区 北集坡镇
联系电话	86-05388913889 13405384433

产品详情

早酥红梨基地、早酥红梨树苗种植管理红香酥梨树苗:果实长卵圆形或纺锤形,平均单果重200克,大 果重498克,果面洁净、光滑、果点大。果皮底色绿黄、阳面2/3鲜红色;果肉白色,肉质细嫩,石细胞 少, 汁多、味甘甜、香味浓。品质极上。华北地区9月下旬成熟, 常温下可贮2~3个月。该品种外观艳丽 ,结果早、丰产。适应性强,较抗梨黑星病、黑斑病。是一个极有希望的红皮、晚熟、耐贮新品种。绿 宝石梨树苗:绿宝石梨,又叫中梨1号,早熟品种,果实圆形或扁圆形,似日韩梨果形,果形整齐,略偏 斜。 秋月。秋月梨是日本的新品种,以丰水、新高、幸水三个品种经过取长补短杂交选育而成,属于中 晚熟褐色砂梨系新品种。该品种果形美、质优、口感好、营养丰富。果形端正,为扁圆形,果形指数0.9 ,果实大小整齐,商品果率高。平均单果重450克,大可达1000克。果皮黄红褐色,果色纯正;果肉白色 ,肉质酥脆,石细胞极少,口感清香,可溶性固形物含量14.5%左右,较南水甜味稍淡。果核小,可食率 可达95%左右,品质佳,贮藏后不变味(无酒精等异味)。无采前落果,采收期长,在赵县9月中旬成熟。 适应性较强,抗寒、抗旱,较抗黑星、黑斑病,各种土壤均可栽培,对水肥条件要求不严。疏去花序上 部的花果。 整棵协调布局:树冠内膛和下层适当多留,外围和上层少留;辅养枝多留,骨干枝少留;骨 干枝中部多留,下部少留;盛果期树背上枝多留,背后枝少留;花多树弱时少留。疏花疏果的总体原则 是:保证产量,提高品质,选优去劣,调节分布。梨树苗:果实近圆形或稍扁,平均单果重250克,大果 重500克。不套袋果果皮黄绿色,贮藏后变为金黄色。套袋果果皮淡黄色,果面洁净,果点小而稀。果肉 白色,肉质脆嫩,多汁,石细胞少,果心极小,可食率达95%以上,不套袋果可溶性固形物含量14%~16 %, 套袋果12%~15%, 风味甜。果实9月中下旬成熟, 果实发育期129天左右。较耐贮藏。亩移栽2200株 左右。2-4月移栽,每亩施腐熟农家肥1000公斤,既仍保留基部三主枝,其上方纺锤形全树留主枝12个左 右。集中烧毁,并涂抹福美砷可湿性粉剂30至60倍液。梨树萌动前喷40%福美砷可湿性粉剂100倍或腐烂 敌100倍液,黄冠梨树苗、华山梨树苗、新高梨树苗、

高度密植:株行距为 1-2 米 × 3 米 ,每公顷栽 3333-1667 株。 要根据品种特性、果园地势、土壤特点、管理技术水平、机械化程度确定合适的密度。幸水、早黄和北丰等品种树冠小,可适当密植。一般株距以 2-3 米 、行距以 4-5 米

为宜,这样便于小型农业机械的操作管理,充分截获和利用光能。栽植湘南和长十郎梨,每公顷栽植3240株,2年生每公顷产量平均为33243千克

。果形端正,果实整齐度极高,商品果率高。果形为扁圆形,果形指数0.8

左右。果皮黄红褐色,果色纯正;果肉白色,肉质酥脆,石细胞极少, 口感清香,

可溶性固形物含量14.5%左右。果核小,可食率95%以上,品质上等。秋月梨:果个大,平均单果重450g,大果可达1000g。果实于9月中下旬成熟。红香酥梨:果实长卵圆形或纺锤形,平均单果重200克,大果重498克,果面洁净、光滑、果点大。果皮底色绿黄、阳面2/3鲜红色;果肉白色,肉质细嫩,石细胞少,汁多、味甘甜、香味浓。早熟品种。玉露香:果实性状平均单果重236.8克,大果重450克;果实近球形,果形指数0.95。果面光洁细腻具蜡质,保水性强。阳面着红晕或暗红色纵向条纹,采收时果皮黄绿色,贮后呈黄色,色泽更鲜艳。果皮薄,果心小,可食率高(90%)。果肉白色,酥脆,无渣,石细胞极少,汁液特多,味甜具清香,口感很好;可溶性固形物含量12.5%~16.1%,总糖8.7%~9.8%,酸0.08%~0.17%,糖酸比68.22~95.31 1,品质很好。果实耐贮藏,在自然土窑洞内可贮4~6个月,恒温冷库可贮藏6~8个月。而尽量改造利用。梨树对土壤的适应能力很强,不论山地、丘陵、沙荒、洼地、盐碱地和红壤,六月雪梨树苗、六月酥梨树苗、香梨王梨树苗、开花结果再缩成枝组,即使是强旺直立枝也不应轻易蔬除,用75%百菌清1000倍液进行苗床消毒。(2)扦插种苗。香艳梨的繁殖以扦插为主。中国南北各地梨区,100~150年生的大树很多,且枝叶繁茂,

早红酥梨:果实长卵圆形或纺锤形,平均单果重200克,最大果重498克,果面洁净、光滑、果点大。红香酥梨果皮底色绿黄、阳面2/3鲜红色;果肉白色,肉质细嫩,石细胞少,汁多、味甘甜、香味浓。品质极上。红香酥梨华北地区9月下旬成熟,常温下可贮2~3个月。红香酥梨该品种外观艳丽,结果早、丰产。适应性强,较抗梨黑星病、黑斑病。是一个极有希望的红皮、晚熟、耐贮新品种。纺锤形,主干分枝点高60厘米,每隔20厘米留一个主枝,主枝呈螺旋式上升,形成下宽上窄树体,形似纺锤,树高2.5米。修剪时,留意开张枝条角度,对斜生长枝缓放,直立长枝从基部向上每隔20厘米左右环刻一圈,延续环刻到梢端,翌年抽生出3—7个中短枝和许多叶丛枝。早红酥梨:果实长卵圆形或纺锤形,平均单果重200克,最大果重498克,果面洁净、光滑、果点大。红香酥梨果皮底色绿黄、阳面2/3鲜红色;果肉白色,肉质细嫩,石细胞少,汁多、味甘甜、香味浓。品质极上。红香酥梨华北地区9月下旬成熟,常温下可贮2~3个月。红香酥梨该品种外观艳丽,结果早、丰产。适应性强,较抗梨黑星病、黑斑病。是一个极有希望的红皮、晚熟、耐贮新品种。产卵盛期是梨树花序分离至花瓣含苞待放时,5月中下旬幼虫蛀果为害。如:小香山梨、麻梨、八里香和花盖等品种。白梨的抗寒力也可到-23~-25 的低温。每墒扦插苗4000-5000株,苗床做成高埂低墒,墒面平整,