

## 早酥红梨基地、早酥红梨树苗种植管理

产品名称	早酥红梨基地、早酥红梨树苗种植管理
公司名称	泰安开发区林泽园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	公司:林泽农业 粗度:1 根系:30
公司地址	山东 泰安市岱岳区 北集坡镇
联系电话	86-05388913889 13405384433

## 产品详情

早酥红梨基地、早酥红梨树苗种植管理 红香酥梨树苗：果实长卵圆形或纺锤形，平均单果重200克，大果重498克，果面洁净、光滑、果点大。果皮底色绿黄、阳面2/3鲜红色；果肉白色，肉质细嫩，石细胞少，汁多、味甘甜、香味浓。品质极上。华北地区9月下旬成熟，常温下可贮2~3个月。该品种外观艳丽，结果早、丰产。适应性强，较抗梨黑星病、黑斑病。是一个极有希望的红皮、晚熟、耐贮新品种。绿宝石梨树苗：绿宝石梨，又叫中梨1号，早熟品种，果实圆形或扁圆形，似日韩梨果形，果形整齐，略偏斜。秋月。秋月梨是日本的新品种，以丰水、新高、幸水三个品种经过取长补短杂交选育而成，属于中晚熟褐色砂梨系新品种。该品种果形美、质优、口感好、营养丰富。果形端正，为扁圆形，果形指数0.9，果实大小整齐，商品果率高。平均单果重450克，大可达1000克。果皮黄红褐色，果色纯正；果肉白色，肉质酥脆，石细胞极少，口感清香，可溶性固形物含量14.5%左右，较南水甜味稍淡。果核小，可食率可达95%左右，品质佳，贮藏后不变味(无酒精等异味)。无采前落果，采收期长，在赵县9月中旬成熟。适应性较强，抗寒、抗旱，较抗黑星、黑斑病，各种土壤均可栽培，对水肥条件要求不严。疏去花序上部的花果。整棵协调布局：树冠内膛和下层适当多留，外围和上层少留；辅养枝多留，骨干枝少留；骨干枝中部多留，下部少留；盛果期树背上枝多留，背后枝少留；花多树弱时少留。疏花疏果的总体原则是：保证产量，提高品质，选优去劣，调节分布。梨树苗：果实近圆形或稍扁，平均单果重250克，大果重500克。不套袋果果皮黄绿色，贮藏后变为金黄色。套袋果果皮淡黄色，果面洁净，果点小而稀。果肉白色，肉质脆嫩，多汁，石细胞少，果心极小，可食率达95%以上，不套袋果可溶性固形物含量14%~16%，套袋果12%~15%，风味甜。果实9月中下旬成熟，果实发育期129天左右。较耐贮藏。亩移栽2200株左右。2-4月移栽，每亩施腐熟农家肥1000公斤，既仍保留基部三主枝，其上方纺锤形全树留主枝12个左右。集中烧毁，并涂抹福美砷可湿性粉剂30至60倍液。梨树萌动前喷40%福美砷可湿性粉剂100倍或腐烂敌100倍液，黄冠梨树苗、华山梨树苗、新高梨树苗、

高度密植：株行距为1-2米×3米，每公顷栽3333-1667株。要根据品种特性、果园地势、土壤特点、管理技术水平、机械化程度确定合适的密度。幸水、早黄和北丰等品种树冠小，可适当密植。一般株距以2-3米、行距以4-5米

为宜，这样便于小型农业机械的操作管理，充分截获和利用光能。栽植湘南和长十郎梨，每公顷栽植3240株，2年生每公顷产量平均为33243千克

。果形端正，果实整齐度极高，商品果率高。果形为扁圆形，果形指数0.8

左右。果皮黄红褐色，果色纯正；果肉白色，肉质酥脆，石细胞极少，口感清香，

可溶性固形物含量14.5%左右。果核小，可食率95%以上，品质上等。秋月梨：果个大，平均单果重450g，大果可达1000g。果实于9月中下旬成熟。红香酥梨：果实长卵圆形或纺锤形，平均单果重200克，大果重498克，果面洁净、光滑、果点大。果皮底色绿黄、阳面2/3鲜红色；果肉白色，肉质细嫩，石细胞少，汁多、味甘甜、香味浓。早熟品种。玉露香：果实性状平均单果重236.8克，大果重450克；果实近球形，果形指数0.95。果面光洁细腻具蜡质，保水性强。阳面着红晕或暗红色纵向条纹，采收时果皮黄绿色，贮后呈黄色，色泽更鲜艳。果皮薄，果心小，可食率高（90%）。果肉白色，酥脆，无渣，石细胞极少，汁液特多，味甜具清香，口感很好；可溶性固形物含量12.5%~16.1%，总糖8.7%~9.8%，酸0.08%~0.17%，糖酸比68.22~95.31，品质很好。果实耐贮藏，在自然土窑洞内可贮4~6个月，恒温冷库可贮藏6~8个月。而尽量改造利用。梨树对土壤的适应能力很强，不论山地、丘陵、沙荒、洼地、盐碱地和红壤，六月雪梨树苗、六月酥梨树苗、香梨王梨树苗、开花结果再缩成枝组，即使是强旺直立枝也不应轻易疏除，用75%百菌清1000倍液进行苗床消毒。（2）扦插种苗。香艳梨的繁殖以扦插为主。中国南北各地梨区，100~150年生的大树很多，且枝叶繁茂，

早红酥梨：果实长卵圆形或纺锤形，平均单果重200克，最大果重498克，果面洁净、光滑、果点大。红香酥梨果皮底色绿黄、阳面2/3鲜红色；果肉白色，肉质细嫩，石细胞少，汁多、味甘甜、香味浓。品质极上。红香酥梨华北地区9月下旬成熟，常温下可贮2~3个月。红香酥梨该品种外观艳丽，结果早、丰产。适应性强，较抗梨黑星病、黑斑病。是一个极有希望的红皮、晚熟、耐贮新品种。纺锤形，主干分枝点高60厘米，每隔20厘米留一个主枝，主枝呈螺旋式上升，形成下宽上窄树体，形似纺锤，树高2.5米。修剪时，留意开张枝条角度，对斜生长枝缓放，直立长枝从基部向上每隔20厘米左右环刻一圈，延续环刻到梢端，翌年抽生出3—7个中短枝和许多叶丛枝。早红酥梨：果实长卵圆形或纺锤形，平均单果重200克，最大果重498克，果面洁净、光滑、果点大。红香酥梨果皮底色绿黄、阳面2/3鲜红色；果肉白色，肉质细嫩，石细胞少，汁多、味甘甜、香味浓。品质极上。红香酥梨华北地区9月下旬成熟，常温下可贮2~3个月。红香酥梨该品种外观艳丽，结果早、丰产。适应性强，较抗梨黑星病、黑斑病。是一个极有希望的红皮、晚熟、耐贮新品种。产卵盛期是梨树花序分离至花瓣含苞待放时，5月中下旬幼虫蛀果为害。如：小香山梨、麻梨、八里香和花盖等品种。白梨的抗寒力也可到-23~-25的低温。每墒扦插苗4000-5000株，苗床做成高埂低墒，墒面平整，