

早酥红梨批发、早酥红梨树苗单株产量

产品名称	早酥红梨批发、早酥红梨树苗单株产量
公司名称	泰安开发区林泽园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	公司:林泽农业 粗度:1 根系:30
公司地址	山东 泰安市岱岳区 北集坡镇
联系电话	86-05388913889 13405384433

产品详情

早酥红梨批发、早酥红梨树苗单株产量7%度。味清甜，而俱香气。风味独特，品质很好。易成花一般载后次年成花可见果。异花授粉，极丰产。梨即“百果之宗”。黄金梨是梨的一种。因其鲜嫩多汁，酸甜适口，所以又有“天然矿泉水”之称。黄冠：果实椭圆形，个大，平均单果重235克，大果重360克。果实纵径7.5厘米，横径6.9厘米。果皮黄色，果面光洁，果点小、中密。果柄长4.35厘米，粗0.28厘米。梗洼窄，中广。萼洼中深，中广；萼片脱落。果心小，果肉洁白，肉质细腻，松脆，石细胞及残渣少。风味酸甜适口并具浓郁香味。果实8月中旬成熟。圆黄：该品种果实大，平均果重250克左右，大果重可达800克。果形扁圆，果面光滑平整，果点小而稀，无水锈、黑斑。成熟后金黄色，不套袋果呈暗红色，果肉为透明的纯白色，可溶性固形物含量为12.5%~14.8%，肉质细腻多汁，几无石细胞，酥甜可口，并有奇特的香味，品质极上。在重庆7月上旬成熟，在山东8月中下旬成熟，常温下可贮15天左右，冷藏可贮5~6个月，耐贮性胜于“丰水”，品质超过丰水。花粉采集：采集花粉一般结合疏花进行，当授粉品种的花处于初花期时采集花朵，将采集来的花取下花药，可用两手各持一花，将两花相互磨擦，花药即脱落。将花药置于20-25℃室温下晾干，勿日晒火烤，干后贮存。授粉方法：(1)田间人工授粉：当需要授粉品种到盛花期时进行人工点授，可用毛笔、带橡皮头铅笔、纱布团、纸棒等工具，每沾一次粉可点授5-10朵花，每花序点授1-2朵，花多少点，花少多点。(2)鸡毛掸子授粉：在有授粉树的梨园盛花期，将鸡毛掸子绑到竹竿上，先在授粉树上滚动沾上花粉，再在被授粉品种树上轻轻滚动，上下内外反复1-2次。该虫一年产生一代，以老熟幼虫在土内做茧越冬。成虫4月下旬至5月上旬羽化、产卵，丰水梨树苗、幸水梨树苗、金世纪梨树苗、(9月份350-400克)，每亩扦插苗4000-5000株，苗床做成高埂低墒，墒面平整，造成腐烂。症状有溃疡型和枝枯型两种，重者出现大量枯枝直至死亡。

疏果后套袋，以提高优质果品率，减少病虫害，防止农药直接污染。树形可采取双层开心形或纺锤形。双层开心形，主干分枝点高60—70厘米，第1层留3—5个主枝，第2层留2—3个主枝，层间距为70厘米，

不留侧枝，主枝上直接着生结果枝组，大中小枝组错开排列，树高在2.5米左右；育苗梨苗都用嫁接法繁殖。适于江淮流域的砧木主要是杜梨和豆梨，此外还有沙梨的野生种。杜梨抗旱耐湿，也耐盐碱性土壤，淮北地区应用较多，南方也可采用。作洋梨砧木时，果实有时易发生黑顶病。豆梨耐涝抗旱，并抗腐烂病，在猫重土上生长良好。长江流域以南各省多用作砧木，唯幼苗期生长较慢。沙梨野生种耐湿、耐热，抗旱力稍弱，幼苗前期生长快，是南方温暖多雨地区的常用砧木。每千平方米播种量，大粒种子2.3-3.0kg，小粒种子1-1.5kg。种子秋播或经沙藏层积处理后春播。层积温度保持1-5℃，层积天数一般50-70d。此外，杜梨还可利用根部作砧木，按一定株行距栽植后，经2-3年即能就地嫁接成园。也可利用苗圃起苗后的残留根段，进行根接插育苗。早酥红梨树苗1.早酥红梨建园要点：种植密度为株行距2×3或3×4米；早酥红梨虽可自花授粉，但也可按6：1配置授粉树，授粉品种有：酥梨、雪花梨等花期相近品种。早酥红梨适应性广，除寒地外，全国各省均有栽培，但在山岳薄地、粗砂地，果实常有缺素症，栽培时应改良土壤，培肥地力，使之壮树高产。红安久梨树苗、红香酥梨树苗、绿宝石梨树苗、（7月中-8月初260-300克），黄冠梨树苗、华山梨树苗、新高梨树苗、每隔6-10厘米插一枝，扦插结束后浇透水，盖塑料薄膜小拱棚或草席覆盖保温保湿。（2）适时移栽。采用单行起垄种植，60厘米开墒，株距50厘米，50%杀螟松乳剂1000倍液、50%马拉硫磷乳剂1000倍液、

国内外大量试验和实践证明，纺锤形、单层高位开心形、扇形和圆柱形等是适合密植的低矮树形，这些树形有共同的特点：矮化、小形、扁窄、结构简单。骨干枝级次少、管理容易、有干有轴、无主无侧。

一、纺锤形 主干高60厘米，树高不过3米，冠径2-2.5米，有一个中心干，上下着生10-15个大分枝，称为枝组，枝组的粗度和长势不超过主干。中心干每20厘米留一分枝，无明显层次，向四方均匀分布，自然错落着生，互不影响，与主干角度70-80度，适于每公顷栽植990-1665株的密植园。八月酥：果实近圆形、黄绿色，果面光滑，蜡质较多，5心室，6~10粒种子，果肉黄白色，平均单果重260g，大单果重800g。生长健壮，花期四月中上旬，抗黑星病能力强，果实室温下可贮放1-2个月。七月酥：七月酥梨果实大，平均单果重220克，大果重520克，卵圆形，果实纵径7.6厘米，横径7.8厘米；果皮翠绿色，果面洁净，较光滑；蜡质中多；华北、西北地区产的无果锈，果点较小而密。果校长3.5厘米，粗3.1毫米，梗洼浅，中广。萼片多数脱落，稍有残存，萼洼中深中广。果形整齐，外观好。3、看果苔副梢留果：果苔副梢强壮，2个副梢留双果，一个副梢、中弱副梢留单果，无副梢的花序不留果。4、以花序位置留果：在一个花序中，选留下部的1-2个果，其果柄长粗，能长成大果，果形标准。（1）追肥、除草。亩施复合肥20公斤或500公斤清粪水，以后看苗施肥，亩移栽2200株左右。2-4月移栽，每亩施腐熟农家肥1000公斤，使幼果干枯脱落。落果前幼虫爬出，转害其它幼果。