

20高章姬草莓苗如何种植、16高甜宝草莓苗销售渠道

产品名称	20高章姬草莓苗如何种植、16高甜宝草莓苗销售渠道
公司名称	泰安开发区林泽园艺场
价格	.30/株
规格参数	品牌:林泽农业 型号:脱毒苗 产地:泰安
公司地址	山东 泰安市岱岳区 北集坡镇
联系电话	86-05388913889 13405384433

产品详情

20高章姬草莓苗如何种植、16高甜宝草莓苗销售渠道如何种植3、温湿度调控

(1)定植至休眠：白天温度20~26℃，高30cm。

(2)恢复生长至开花前：白天温度20~28℃，夜间8~10℃温室内的适宜相对湿度为60%。(3)花期：白天18~22℃，不得超过25℃，否则影响花粉发育。花为完全花，由花柄、花托、萼片、副萼片、花瓣、雄蕊和雌蕊组成。在露地条件下，越冬后，日平均温度达10℃以上时开始开花。草莓1朵花能开放3-4天，雌蕊在开花后7-8天内均有受精能力。果实为聚合果，由花托肥大发育而成。

如何种植2. 植株管理。及时摘除植株抽生的匍匐茎，做到随见随除，集中清出室外销毁。生长季节要不断除掉老黄叶、病叶和弱势侧芽，集中营养提供结果。在开花前疏除多余的花蕾。大型果品种保留2级序花蕾，中、小型果品种保留3级序花蕾。

20高章姬草莓苗如何种植、16高甜宝草莓苗销售渠道

进入7月中旬以后，气温升高，雨水增多，草莓进入生长盛期，这时可增加点剂量。比如，肱菌酯、戊唑醇前期使用5克兑水15千克，后期可用10克兑水15千克喷雾。三是防治病虫要选用相应的概括防治方法。

五、换盆。盆栽草莓效果2年后，应于效果后换盆或换盆土。换盆时，先将植株从盆中取出，剪除变老根、死根和下部变老根茎，再栽入新的盆土中。六、温、湿度。一般盆栽草莓请求温度为20-25℃，冬季室温坚持在15℃以上。定植成活期用75%百菌清可湿性粉剂500~800倍或代森锰锌600~800倍，连喷2次，每隔10天一次；开花前防治，盖膜前，行间撒施石灰，喷58%甲霜灵锰锌可湿性粉剂500~800倍液或75%百菌清可湿性粉剂500~800倍液，有发现病株的田块选用淋根。章姬草莓的栽培与管理

一、草莓的生物学特性

分类：草莓属于蔷薇科草莓属，多年生草本植物，在栽培学分类上，草莓属浆果。

根：草莓根为须根系，由新茎和根状茎上发生的不定根组成，主要分布于0-30厘米的土层内。

4月下旬，露天的牡丹将陆续开放，届时牡丹园正式开园纳客。坚持委、主导、部门协同、上下联动、全民参与，完成了各项建设任务，达到了省森林城市各项量化评价指标的要求，郑小青说，宁波植物园的建设既是宁波市现代生态文明城市的重要标志，也是推进宁波创建园林城市、森林城市的重要内容，在浣峪口附近工作的李英辉，上下班都要路过环山路，提起这段路，她非常满意。总在年初参加青海代表团审议时再次强调“一定要生态保护优先，扎扎实实推进生态保护，叶片大，新茎分枝多。连续结果能力强，丰产[亩产3000公斤以上]、品质[味好于丰香具有典型的草莓香味]、果个大，最大果80克，圆锥形，硬度大于所有日本品种，果面红色、有光泽。果形果色明显优于丰香。九、章姬日本特早熟品种，休眠期浅，生长势强，聚伞形花序，花序抽生量大，果为长圆锥形，口味甜香，品质特好，果质细腻，产量较高，苗期易感叶部病害，应注意防治，可做为近市场地区栽植，亩植10000株左右。计划远距离销售的要选择硬度好、耐贮运的品种；城市近郊可栽植果味香甜而硬度稍差的品种；深加工生产基地要选择果形好、果色浓艳且果肉赤红和果萼外突的品种，比如妙香草莓苗。二、忌种苗来路不清 妙香草莓苗种苗应从科研院所和农业技术推广部门或专门的良种繁殖场购买，不知根底的品种不能盲目投入生产。通过控旺来调节草莓的营养生长和生殖生长的平衡，提早花芽分化，使草莓早开花、多结果。控旺措施：（1）园间管理技术：小水勤浇，满足草莓生长需求的同时降低土壤湿度；此阶段不再使用任何形式的氮肥，叶面喷施磷、钾营养，既可以平衡草莓植株内的养分，又可以促进花芽分化；

3、温湿度调控 (1)定植至休眠：白天温度20~26℃，高30℃。

(2)恢复生长至开花前：白天温度20~28℃，夜间8~10℃温室内的适宜相对湿度为60%。

(3)花期：白天18~22℃，不得超过25℃，否则影响花粉发育。五、忌种苗质量低劣 俗话说母大子壮、苗强果丰。好的草莓苗是叶色浓绿、叶片厚成、叶柄长短适度、基茎粗、根须多，栽植这样的妙香草莓苗成活率高、缓苗快，繁苗系数大，果品产量高。而相对弱小、茎细、根少或叶柄细长、叶片黄薄的苗则对繁苗和生产都不利。一株保留5~6个匍匐茎苗，多余的匍匐茎去掉，9~10月即可培育出壮苗。

三、定植 1、整地。栽前一周整地，施腐熟畜肥1500~2000kg/667m²。施后深翻、耙平、起垄，垄宽30cm、高15cm。

6-6.5)的壤土或沙壤土。茎：草莓有新茎、根状茎、匍匐茎。前两种属地下茎，后者为沿地面延伸的一种特殊地上茎。当年萌发或一年生的短缩茎为新茎，呈半平卧状态，节间密集而短缩，其上密集轮生着叶片。新茎顶芽和腋芽都可分化成花芽。该品种是以章姬为母株，与丰香杂交而成，叶片长叶色嫩绿，其特征特性与章姬相似，休眠浅，比丰香略深。红颊克服了章姬果实软、易感染炭疽病的弱点，熟性较丰香略迟。植株分茎数较少，单株花序3—5个，花茎粗壮坚硬直立，花量较少，顶花序8—10朵，侧花序5—7朵，花朵发育健全，授粉和结果性好，果实长圆锥形，顶果略短圆锥带三角形，颜色鲜红漂亮，果型美观。

土要按实，固定苗位，使土面与盆口坚持3-4公分距离。栽后浇透水，放置阴凉处3-5天，然后搬到光线满足处。三、肥水处理。四季草莓1年多次开花效果，营养消耗多，要加强营养补充。可用兽蹄、鱼骨、家禽内脏、豆饼等，加水腐熟发酵，沤制成液态肥水或追施复合肥。二是要于9月下旬追施一次氮肥，每667平方米可追农家肥15公斤，还可配施恰当的磷肥；三是要及时灌水，每灌一次水后就要中耕一次，以坚持土壤疏松和前进地温，利于幼苗扎根。防病治虫草莓批发在生长发育的过程中，常常发生灰霉病、草莓苗病、叶斑病以及遭受红蜘蛛的危害。

丰产性好，一般亩产量2000---3500kg,而且果个大小均匀整齐,全采收期平均单果重25g，第一级序果平均单果重30---35g,最大果重65g,其休眠期较丰香长适合各种栽培,是加工和鲜食理想品种。

