

海丰板栗苗、海丰板栗苗价格、海丰板栗苗基地

产品名称	海丰板栗苗、海丰板栗苗价格、海丰板栗苗基地
公司名称	泰安市利群农业科技有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市
联系电话	13561766718

产品详情

海丰板栗苗、海丰板栗苗价格、海丰板栗苗基地翻耕林地：板栗果园要适当的进行翻耕工作，通常根据板栗的年龄控制力度。幼林果园以浅耕为主，结果果园要深翻扩穴，增加生土，改良土壤，促进根部生长。成年果园的深耕深度不得低于30厘米，在深耕的时候要注意不可伤到根部。在深耕的时候要对其进行全面清理工作，保证水土设施完好，防止水土流出，清除土壤中有有害物质。

海丰板栗苗、海丰板栗苗价格、海丰板栗苗基地天津主栽品种：主要有燕魁、早丰、燕红及盘山1号等。

石丰板栗苗：果实性状：总苞扁椭圆形，重59克左右。刺束短而密，硬。总苞皮中厚，出实率40%。坚果椭圆形，平均单粒重9.5克。含水54.3%，糖15.8%，淀粉63.3%，脂肪3.3%，蛋白质10.1%。较耐贮藏。树势稳定，适于密植栽培，早实丰产性好，抗逆性强，适应范围广，果实品质优良。在泰安4月上旬萌芽，6月中旬盛花，果实在9月下旬成熟，11月份落叶。

随苗木季节，规格，数量变化不同，板栗苗价格存在浮动，咨询板栗苗价格就到泰安开发区利群苗圃。

海丰板栗苗、海丰板栗苗价格、海丰板栗苗基地广西主栽品种：主要有大果乌皮栗、中果红皮油栗、早熟油栗、红皮油栗、大乌皮栗等。

海丰板栗苗、海丰板栗苗价格、海丰板栗苗基地板栗整形：整形修剪时期一般在冬季，树形主要有自然开心形、变则主干形、主干疏散分层形。一般多采用主干疏散分层形，能使树冠疏散，透气透光良好，有利于树体生长和结实。整形时，定干高度0.8米左右，主干枝继续延长，作中央领导枝，选三个角度为60度的壮枝作为第一层主枝，保持30厘米的层内距。随中央领导枝的生长，在距第一层主枝向上1米外选二个和第一层错开的分枝作第二层主枝，在距第二层主枝向上0.6米左右外选1--2个分枝作第三层主枝封

顶。同时，在主枝上选留侧枝，第一层每一根主枝上各留3个，第二层各留2--3个，第三层各留1--2个。侧枝要上下交错，避免重叠。

播种：3月上旬--4月上旬，按行距一尺，株距五、六寸点播，要求当年实生苗茎粗0.8厘米以上，苗高1米以上，根系发达，每亩育苗一万株。板栗修剪及管理技术：1、幼苗修整。板栗成长过程中要注意修剪，且要修剪成自然开心形，有3~4个主枝，树冠矮而开张，内膛通风良好，适于密植。其整形方法是在苗木离地1米高处，选择饱满芽的上方短截，促使苗干自剪口以下发生分枝，从中选留3~4个生长健壮、分布均匀、角度适中的培养为主枝。主枝必须向外斜生，开张角度为50~60度。以后，从各主枝上发生的分枝中，选留有一定间隔距离、生长强健的分枝2~3个，各留60~70厘米短截，培养为副主枝。3~4年后，树形即可基本形成。2、成苗修整。由于栗树枝梢顶部几个芽的发育比较充实饱满，节间短，又有先端生长优势，所以容易发生三叉枝，四叉枝或轮生枝。整形时，应对这类枝及早抹芽疏枝，防止竞争枝的发生。对生长过旺的枝梢，夏季要及时摘心，或冬季于饱满芽以下短截，削弱其生长势，促使分枝以加速树冠的形成。对一般枝梢可不短截，利用顶芽枝向外延伸扩大树冠。对扰乱树形，影响骨干枝生长者，予以疏剪去除。3、结果树的修剪。连续结果2年以上的幼树，树势渐趋缓和、粗壮，结果枝比例开始下降，此时修剪应由生长季摘心为主，转向以冬季修剪为主。树冠外围生长健壮的一年生枝，大多为优良结果母枝，应保留，如过密，则疏剪其中较弱的枝。生长过旺的结果母枝应在其下方另留1~2枝，培养结果母枝，既可增加产量，又分散养分缓和生长势。若母枝因连年结果而趋于衰弱时，应予回缩修剪，并在下部培养新的结果母枝代替。凡在结果母枝附近的细弱枝，应及早疏除，使养分集中供应母枝，使其转弱为强。疏除病虫枝、交叉重叠枝。对一般弱枝或雄花枝，可短截或回缩，促使剪口芽或剪口下方的枝条转化成新结果母枝。4、施肥保墒要求。为创造适宜板栗生长的基本条件，每年雨季对树下土壤进行深刨，在树下压绿肥，修好保水工程，以利蓄水保墒。为提高树体营养状况，借雨追肥以速效性氮肥、复合肥为主。配合适量硼砂或施用板栗专用肥，对栗实膨大、花芽分化、降低空蓬有利。同时就地取材，利用果园周边杂草、作物秸秆，覆盖树盘具有防止水土流失，减少地面蒸发，调节地温，增加土壤有机质含量等作用。早秋深翻多施有机肥料，培肥地力，增强树势，有利于枝芽充实和翌年板栗生长结果。5、病虫害防治。板栗嫁接后萌发的嫩芽、幼枝及叶片，常被金龟子、栗大蚜、象鼻虫、红蜘蛛等害虫为害。根据害虫发生情况及时打药除虫，一般可选用氯氰菊酯、菊杀乳油、乐果等药剂，防治板栗红蜘蛛也可选用乐果涂干法，即在每年的5月中旬左右红蜘蛛孵化盛期，用刮皮刀把树干粗皮刮露嫩皮，宽度10厘米，涂4倍-5倍氧化乐果或乐果乳剂，待稍干后再涂一遍，然后用废报纸或塑料布包扎好，一年涂药1次2次即可控制害虫危害叶片。