

玛斯义陶芬无花果苗

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 玛斯义陶芬无花果苗 |
| 公司名称 | 泰安开发区禄源园艺场 |
| 价格 | 3.00/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村 |
| 联系电话 | 13375383809 |

产品详情

玛斯义陶芬无花果苗保持无花果养分平衡，必须使枝条均匀分布、疏密适中，而且修剪要小心，不要剪掉了形成果实的当年新枝。合理喷施生长素
当遇到气温突然下降的情况无花果的成熟时间就会推迟，这样就会造成无花果落果。

无花果苗栽后每7-10天浇水一次，保持地表潮湿，直至9月。其间下一场大雨，可以少浇一次水，但下小雨不能代替浇水（2）5-8月，每次浇水前，取2号16-8-16复合肥8-10公斤/亩，预先化开，随水冲施。（3）每15天左右向叶底面喷布一次24号叶肥。

防治根结线虫目前主要是避免老园连作和对苗木进行检疫消毒，有条件时也可对土壤进行消毒处理。对果实炭疽病应在夏秋季果实发病前及早喷布200倍石灰倍量式波尔多液或75%百菌清600~800倍液加以防治，后者施药的安全间隔期（后一次施药距收获的天数）7~14天。

泰安开发区禄源苗木基地面向全国批发无花果苗。无花果苗品种：日本紫果，青皮无花果苗，波姬红无花果苗，金傲芬无花果苗，布兰瑞克无花果苗,早黄无花果苗等。欢迎新老客户亲临指导 实地考察！

无花果树苗从7月中旬开始，陆续到11月份成熟，无花果的采摘一般宜在晴天的早晨或傍晚进行，见已成熟的果实顶端有一小孔微开，果皮出现固有品种（多分红、黄品种）的色泽时，采摘，过熟的果实采后不耐贮藏和运输。

无花果树苗喜光，光照充足，树体健壮，花芽饱满，果多果大，高产优质，果枝寿命长；相反光照条件差，树体养分贮藏少，果枝寿命短，产量低，品质差。影响无花果树苗发芽迟早主要是温度，无花果一般比其它果树快，3月下旬芽，4月气温达到14 左右时发芽，但因品种、等存有差异。

进入结果期后，除徒长枝外，几乎树冠中所有的新梢都能成为结果枝。故栽植后2~3年即可开始结果，7~10年可进入盛果期。

无花果苗还可以盆栽栽种，如果是纯观赏，盆大小无所谓，如果既想观赏，又想吃多点无花果，建议种植的盆尽量大，这样植株才能长的足够健壮，建议用30cm以上口径的花盆。。无花果树苗会自行繁殖根蘖苗，于适宜种植的春、秋季节，将母株周围的根蘖苗带根挖出，另行种植即可。

无花果主要品种有：青皮（威海、上海青皮）、玛斯义陶芬、波姬红、金傲芬、美丽亚、福建白蜜双果（长江七号）、中国紫果(红矮生)、日紫、丰产黄、布兰瑞克、早黄（新疆早黄）、中农矮生（B1011）、中农红（B110）、加州黑、蓬莱柿、绿抗一号、砂糖（西莱斯特）、华丽、白马赛、中农寒优、棕色土耳其、沙漠王、卡利亚那、白圣比罗、果王、A813、C47、紫色波尔多（烟台宝贝）、路易斯安-金、奥斯本多产、斯特拉、比尔、亚当等。

玛斯义陶芬无花果苗选择不耐寒品种，如玛斯义·陶芬等进行促成栽培时选用冬暖型日光温室；以抗寒品种如青皮、波姬红等进行延迟栽培时，可选用塑料大棚。