

冬牧70黑麦草种子价格

产品名称	冬牧70黑麦草种子价格
公司名称	济宁圣祥园林绿化有限公司
价格	20.00/个
规格参数	济宁圣祥园林:10 牧草:8 山东:5
公司地址	济宁嘉祥黄垓
联系电话	15853700464

产品详情

冬牧70黑麦草种子价格

牧草种子播种前怎么处理好?

一、硬实处理在播种豆科牧草前，应对硬实种子进行处理。处理方法有：一是擦破种皮。可以用碾子碾压或用碾压机处理，也可以将豆科牧草种子与一定数量的碎石、沙砾混合后放于搅拌震荡器中进行震荡，直到种子表面粗糙起毛，但未压坏种子为宜。二是变温浸种。此法适用于土壤湿润或灌溉良好的地方。通常是用热水将种子浸泡24小时后捞出，白天放到太阳下暴晒，夜间转至凉爽处，并经常加一些水保持种子湿润，当大部分种子略有膨胀时，就可据墒播种。三是用酸处理。在种子中加入3%—5%的稀硫酸或稀盐酸并搅拌均匀，当种皮出现裂纹时，将种子放入流水中冲洗干净，略加晾晒便可播种。

二、接种处理在新垦土地上首次种植豆科牧草，在同一地块上再次种植同一种豆科牧草，或者在过于干旱而酸度又高的地块上种植豆科牧草，都要通过接种根瘤菌来增加根瘤数量常用的接种方法有：（一）干瘤法。就是选取盛花期豆科牧草的根部，用水洗净，放在避风、阴暗、凉爽的地方慢慢阴干，在播种前将其磨碎拌种。（二）鲜瘤法。就是将根瘤菌或磨碎的干根用少量水稀释后，与蒸煮过的泥土混拌，在20—25℃条件下培养3—5天，将这种菌剂与待播种子混拌。（三）根瘤菌剂拌种。就是把根瘤菌剂按照说明配成菌液喷洒到种子上，每公斤种子拌5克根瘤菌剂。在接种根瘤菌时，不得与农药一起拌种，不在太阳直射下拌种，已拌过根瘤菌的种子不与生石灰或大量肥料接触。接种同族根瘤菌有效，而不同族相互接种无效。

三、去芒处理对一些禾本科牧草的种子要进行去芒处理。去芒可以采用去芒机或用环形镇压器进行压切并筛选。

四、浸种处理蓼科、菊科牧草的种子在播前将种子浸泡在温水中一段时间如串叶松香草种子在播前应用30℃的水浸泡12小时，然后进行播种；鲁梅克斯在播种前要将种子用布包好放入40℃的水中浸泡6~8小时

，捞出后晾在25—28 的环境中催芽15—20小时，有70%—80%的种子破壳时再进行播种。当然在墒情较好的条件下，各种牧草种子也可以进行直播，但应保持土壤湿润。

冬牧70黑麦草种子价格