

## 波姬红无花果苗批发、波姬红无花果苗繁育基地

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 波姬红无花果苗批发、波姬红无花果苗繁育基地 |
| 公司名称 | 泰安开发区禄源园艺场            |
| 价格   | 3.00/棵                |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村   |
| 联系电话 | 13375383809           |

### 产品详情

波姬红无花果苗批发、波姬红无花果苗繁育基地按其正常结实是否需经授粉以及花的类型，可分4个类群或变种。多数栽培品种属于其中的普通无花果类群，在隐头花序中只有雌花，不需授粉能单性结实。

无花果不是很耐寒，在北方的广大地区可以栽种布兰瑞克、青皮等耐寒品种，而且北方温差大，栽种这些品种果实品质还是很优秀的。无花果小苗栽下后，要合理浇水，维持土壤的微湿疏松，切忌浇水过多，做到这点，温度在二十度以上时很快就会发芽，这种树生命力比较强大，一般扦插枝条都能成活的。

无花果第一年的小苗栽培的话，主要应该促进小苗的生长为主，成活后要多次追肥，追肥可使用腐熟的有机肥混合高氮型复合肥，这样可以促进无花果快速生长，为早日定型做准备。此外生长期要合理浇水，切忌过多。

成熟无花果极易腐烂变味，红色品种且易变色，即使短期贮藏也需0度左右的低温和85%~90%的相对湿度。一般宜随采收随处理，不要久贮。

无花果树等长到一定高度时，可以在三十厘米处截头，培养结果主枝三到四个，并注意一定的角度改善光照，主枝长到四五十厘米时可以摘心，控制株形促发结果的侧枝，有果实的话还可以促进果实的生长和膨大。夏季注意防治红蜘蛛等害虫，到了秋季可以恰当追施基肥，以有机肥和复合肥为主，让其美美过冬。

树形完成后，每年只疏除无用徒长枝、密生枝、枝和干枯枝，尽量多保留壮枝结果。收秋果为主的品种，因结果部位多在当年生新梢的中下部，对枝条可适度短截。

玛斯义陶芬原产美国加州，该品种夏秋两次结果，但以秋果为主，夏果长卵圆形，较大，平均果重100~150克，果皮绿紫色。秋果倒圆锥形、中大，平均单果重80~100克，成熟时紫褐色。该品种果实个头大，果皮鲜艳，果肉桃红色，肉质稍粗，含糖16~18。果实商品性好，且果皮韧性大，较耐贮运，抗病力特强。

如何选择无花果树苗：很多朋友购买无花果苗时都喜欢说需要多粗多粗的苗木，其实对无花果来说，苗木的粗细并不是判断他好坏的必须标准。

无花果别名奶浆果。果实柔软味甜，具特异风味，富含易为人体吸收的果糖和葡萄糖，胡萝卜素和维生素C的含量也比较高，且含有多种消化酶，能帮助消化，是一种很好的保健果品。

无花果繁殖容易，管理简单，结果早而病虫害少，枝叶光洁，对二氧化硫等有毒气体有较强的吸附和抗御能力，能污染，净化空气，根系耐较重盐碱（一般可达0.3%~0.4%）。因此，家前屋后、厂矿周围，特别是广大的沿海滩涂地区，发展无花果生产极有前途。

繁殖方法:无花果主要有扦插、压条和分株三种繁殖方法,无花果枝条极易生根,在树的新生阶段，你一旦移植它，大部分的果实都会长在老的树枝或者曾经结过果的树枝上。这些树枝现在并不具备什么优势，所以你需要通过修剪掉老的树枝，来促进新的结果枝的生长。

防治根结线虫目前主要是避免老园连作和对苗木进行检疫消毒，有条件时也可对土壤进行消毒处理。对果实炭疽病应在夏秋季果实发病前及早喷布200倍石灰倍量式波尔多液或75%百菌清600~800倍液加以防治，后者施药的安全间隔期（后一次施药距收获的天数）7~14天。