

大青皮花果苗品种介绍、大青皮花果苗种植基地

产品名称	大青皮花果苗品种介绍、大青皮花果苗种植基地
公司名称	泰安开发区禄源园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13375383809

产品详情

大青皮花果苗品种介绍、大青皮花果苗种植基地依果实成熟采收期又可划分为秋果专用型、夏果专用型和夏秋果兼用型三类。我国目前所栽品种基本上引自和日本，有的原名忘佚，已另取异名。

无花果苗栽后每7-10天浇水一次，保持地表潮湿，直至9月。其间下一场大雨，可以少浇一次水，但下小雨不能代替浇水（2）5-8月，每次浇水前，取2号16-8-16复合肥8-10公斤/亩，预先化开，随水冲施。（3）每15天左右向叶底面喷布一次24号叶肥。

进入结果期后，除徒长枝外，几乎树冠中所有的新梢都能成为结果枝。故栽植后2~3年即可开始结果，7~10年可进入盛果期。

泰安开发区禄源苗木基地面向全国批发无花果苗。无花果苗品种：日本紫果，青皮无花果苗，波姬红无花果苗，金傲芬无花果苗，布兰瑞克无花果苗，早黄无花果苗等。欢迎新老客户亲临指导实地考察！

无花果树苗从7月中旬开始，陆续到11月份成熟，无花果的采摘一般宜在晴天的早晨或傍晚进行，见已成熟的果实顶端有一小孔微开，果皮出现固有品种（多分红、黄品种）的色泽时，采摘，过熟的果实采后不耐贮藏和运输。

无花果树苗喜光，光照充足，树体健壮，花芽饱满，果多果大，高产优质，果枝寿命长；相反光照条件差，树体养分贮藏少，果枝寿命短，产量低，品质差。影响无花果树苗发芽迟早主要是温度，无花果一般比其它果树快，3月下旬芽，4月气温达到14左右时发芽，但因品种、等存有差异。

具体操作技术可参照葡萄。扦插地忌连作，以免线虫的传播为害。如冬季利用塑料大棚进行营养袋育苗，可提早成苗。

无花果苗还可以盆栽栽种，如果是纯观赏，盆大小无所谓，如果既想观赏，又想吃多点无花果，建议种

植的盆尽量大，这样植株才能长的足够健壮，建议用30cm以上口径的花盆。。无花果树苗会自行繁殖根蘖苗，于适宜种植的春、秋季节，将母株周围的根蘖苗带根挖出，另行种植即可。

无花果主要品种有：青皮（威海、上海青皮）、玛斯义陶芬、波姬红、金傲芬、美丽亚、福建白蜜双果（长江七号）、中国紫果(红矮生)、日紫、丰产黄、布兰瑞克、早黄（新疆早黄）、中农矮生（B1011）、中农红（B110）、加州黑、蓬莱柿、绿抗一号、砂糖（西莱斯特）、华丽、白马赛、中农寒优、棕色土耳其、沙漠王、卡利亚那、白圣比罗、果王、A813、C47、紫色波尔多（烟台宝贝）、路易斯安-金、奥斯本多产、斯特拉、比尔、亚当等。

大青皮花果苗品种介绍、大青皮花果苗种植基地正常成熟的夏果，一般品质较好。品种间依夏果、秋果形成的能力而属于不同的类型。繁殖和栽植

无花果枝条极易生根，也易发生根蘖，繁殖苗木时扦插、压条和分株等方法都可应用。