

## 味帝李子苗、新品种味帝李子苗、味帝李子苗价格

产品名称	味帝李子苗、新品种味帝李子苗、味帝李子苗价格
公司名称	泰安市利群农业科技有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市
联系电话	13561766718

### 产品详情

味帝李子苗、新品种味帝李子苗、味帝李子苗价格采果肥：在果实成熟前15~22天施入，以磷、钾肥为主，促进果实膨大，提高果实品质。叶面喷肥在整个生长季均可进行。种类和浓度：尿素0.3%，磷酸二氢钾0.3%~0.5%，硫酸亚铁0.2%~0.5%，硼砂0.3%，硫酸锌0.1%，氨基钙300~400倍液，氯化钙0.2%~0.3%。叶面喷布可多次进行（10~15天左右一次），还可结合病虫害防治等共同喷布，花期用0.2~0.3%的硼酸液喷布树冠，可提高座果率。

结果树。根据品种特性。树龄、产量等确定结果母枝的剪留强度和更新方式。逐渐加重短截，调节生殖与营养生长的平衡。疏除内堂枝、密生细弱枝和病虫害枯枝，使枝梢分布均匀、互不遮荫、树体通风透光。适时更新修剪，防止结果部位外移和大小年结果。结合夏剪，以冬剪为主。

果实：核果球形、卵球形或近圆锥形，直径3.5-5厘米，栽培品种可达7厘米，黄色或红色，有时为绿色或紫色，梗凹陷，顶端微尖，基部有纵沟，外被蜡粉，核卵圆形或长圆形，有皱纹。花期4月，果期7-8月。

提高坐果率，促进优质李树花期易受阴雨、冷空气等不良气候的影响，往往易造成坐果率低的问题。为此，应注意从以下几个途径解决：1、正确配栽授粉树 这是取得丰产的前提条件。建园时要根据品种之间的亲和力选择搭配。建园时没有配栽授粉树的李树园子，可引入授粉品种枝条在树冠内进行高接换种(高位嫁接)。一般按1/3比例对植株高接，每株树嫁接1-2个枝条即可。如黑琥珀与黑宝石互为授粉，黑琥珀也可分别选择亚李一号、日本李王、澳得罗达等为授粉品种。美丽李可选择亚李一号、日本太阳神李为授粉树，安哥诺、美国晚熟大李、皇家宝石等可互为授粉。生产上一般只选择2-3个花期相遇的李品种同园栽植，即可解决授粉问题，提高坐果率。2、花期喷硼和放蜂 和杂交油菜一样，如能在初花期对李树喷一次0.3%硼肥液(100斤水兑硼肥3两，购买硼肥时尽量购买正宗硼肥，以免劣质硼肥影响效果)，对提高坐果率有一定效果。如果花期园内很少有蜜蜂飞舞，好到养蜂专业户处借1-2箱蜂子到果园，这样更能充分解决授粉的问题。3、花前灌溉 如春季干旱，应在开花前2周将李园浇水一次，使花开得齐、开得壮。4、花期避雨避寒 花期如遇阴雨，有条件者可在树冠上面搭一框架外盖薄膜，避免雨水冲刷花粉。雨停后如少有蜜蜂，可进行人工辅助授

粉。可用鸡毛掸子从授粉品种树花朵上掸一掸，粘些花粉；再将已粘上花粉的毛掸子在被授粉品种掸一掸，扫一扫，使花能传播到被授粉品种花内的柱头上。人工辅助授粉一天可进行一次，每天好在上午9时至下午5时进行，而且一定要在露水或雨水干后，才能进行人工授粉。五、病虫害防治 李树的虫害主要有蚜虫、桃蛀螟、桑白蚧、红蜘蛛、桃小食心虫，以及红菌性穿孔病(枝干严重流胶)、红点病，生产上主要应搞好常规防治，如通过冬季清园，剪除、搜集病虫枯死枝，并集中烧毁。春季萌芽前(安徽中部在3月中旬，南北方要相应提前或推迟)熬好、打好石硫合剂(见附录)。做到做好这些，就等于做了全年病虫害防治工作的1/4。在此基础上，有条件的地方要搞好病虫测报、预报。蚜虫发生时可用吡虫啉(即一遍净，蚜虫灵)进行防治。红蜘蛛、桑白蚧等可参照安农1号管理技术中病虫害防治部分相应技术。李树性穿孔病应属重点病害，生产上应列为防治重点，其方法为： 增施有机肥，尤其是土杂肥，改良土壤，增强树体抗病能力； 生病时先用农用链霉素(使用倍数见说明书)喷雾。发生流胶时可用石硫合剂残渣或用石硫合剂原药兑水2-3倍后用硬毛刷蘸水涂刷伤口。如在石硫合剂中加入少量生石灰形成石灰浆，则涂刷效果更好。其它可参照桃树相关病虫害防治。

味帝李子苗、新品种味帝李子苗、味帝李子苗价格提高坐果率，促进优质李树花期易受阴雨、冷空气等不良气候的影响，往往易造成坐果率低的问题。为此，应注意从以下几个途径解决：

1、正确配栽授粉树 这是取得丰产的前提条件。建园时要根据品种之间的亲和力选择搭配。建园时没有配栽授粉树的李树园子，可引入授粉品种枝条在树冠内进行高接换种(高位嫁接)。一般按1/3比例对植株高接，每株树嫁接1-2个枝条即可。如黑琥珀与黑宝石互为授粉，黑琥珀也可分别选择亚李一号、日本李王、澳得罗达等为授粉品种。美丽李可选择亚李一号、日本太阳神李为授粉树，安哥诺、美国晚熟大李、皇家宝石等可互为授粉。生产上一般只选择2-3个花期相遇的李品种同园栽植，即可解决授粉问题，提高坐果率。2、花期喷硼和放蜂 和杂交油菜一样，如能在初花期对李树喷一次0.3%硼肥液(100斤水兑硼肥3两，购买硼肥时尽量购买正宗硼肥，以免劣质硼肥影响效果)，对提高坐果率有一定效果。如果花期园内很少有蜜蜂飞舞，较好到养蜂专业户处借1-2箱蜂子到果园，这样更能充分解决授粉的问题。

3、花前灌溉 如春季干旱，应在开花前2周将李园浇水一次，使花开得齐、开得壮。4、花期避雨避寒 花期如遇阴雨，有条件者可在树冠上面搭一框架外盖薄膜，避免雨水冲刷花粉。雨停后如少有蜜蜂，可进行人工辅助授粉。可用鸡毛掸子从授粉品种树花朵上掸一掸，粘些花粉；再将已粘上花粉的毛掸子在被授粉品种掸一掸，扫一扫，使花能传播到被授粉品种花内的柱头上。人工辅助授粉一天可进行一次，每天较好在上午9时至下午5时进行，而且一定要在露水或雨水干后，才能进行人工授粉。五、病虫害防治 李树的虫害主要有蚜虫、桃蛀螟、桑白蚧、红蜘蛛、桃小食心虫，以及红菌性穿孔病(枝干严重流胶)、红点病，生产上主要应搞好常规防治，如通过冬季清园，剪除、搜集病虫枯死枝，并集中烧毁。春季萌芽前(安徽中部在3月中旬，南北方要相应提前或推迟)熬好、打好石硫合剂(见附录)。做到做好这些，就等于做了全年病虫害防治工作的1/4。在此基础上，有条件的地方要搞好病虫测报、预报。蚜虫发生时可用吡虫啉(即一遍净，蚜虫灵)进行防治。红蜘蛛、桑白蚧等可参照安农1号管理技术中病虫害防治部分相应技术。李树细菌性穿孔病应属重点病害，生产上应列为防治重点，其方法为： 增施有机肥，尤其是土杂肥，改良土壤，增强树体抗病能力； 生病时先用农用链霉素(使用倍数见说明书)喷雾。发生流胶时可用石硫合剂残渣或用石硫合剂原药兑水2-3倍后用硬毛刷蘸药水涂刷伤口。如在石硫合剂中加入少量生石灰形成石灰浆，则涂刷效果更好。其它可参照桃树相关病虫害防治。

味帝李子苗、新品种味帝李子苗、味帝李子苗价格李实蜂：年生1代，以老熟幼虫在土壤中结茧越冬、越夏。春季李萌芽时化蛹，花期成虫羽化出土。防治办法：

法兰西李子苗：法兰西李子：又称法国洋李。该品种适应性广，抗逆性强，树体中庸，叶片卵圆形，多以短枝结果为主。果实为卵圆形，果柄部有突起，果皮成熟时为深紫红色，果肉淡黄，肉硬核小脆甜，品质佳，果实可溶性固形物达20%以上。果实耐储运，常温下可储藏20-30天，冷库可贮藏3个月以上。法兰西李子在我国地区算是家喻户晓，因为这几年法兰西李子价格一直攀高，每公斤收购价格在25元左右每公斤，种植户的收入高的很，再加上新特的地理气候优势让法兰西李子的口感更加独特，所以法兰西李子苗在种植非常火，能给老百姓带来高收入、高效益，深受人民的喜爱变成了果树新星。