

## 艳丽草莓苗基地

产品名称	艳丽草莓苗基地
公司名称	泰安市泽农苗木有限公司
价格	4.00/10棵
规格参数	株高:20cm 蓬径:25cm 成活率:95%
公司地址	山东省泰安高新区龙泉社区
联系电话	15725486052

## 产品详情

母苗定植后，前一个月抽生的匍匐茎也要掐掉。这一时期母苗刚定植，对周围环境刚刚适应，苗子还没长壮，此刻留匍匐茎反而会给母株增加负担。除此之外，子苗的较佳苗龄是60天，苗龄太长，根系老化，不利于草莓生产季的生长发育。苗龄过长，果期植株的负担比较大。

艳丽草莓苗植株生长势强，果实圆锥形，果形端正，果面平整，鲜红色，光泽度强。种子黄绿色，平或微凹于果面。果肉

橙红色，髓心中等大小，橙红色，有空洞。果实萼片单层，反卷。在日光温室促成栽培或半促成栽培条件下，一级序果平均单果质量43g，大果质量66g。果实汁液多，风味酸甜，香味浓郁，含可溶性固形物9.5%，总糖7.9%，可滴定酸0.4%，维生素C 0.63 mg/g-1，果实硬度2.73 kg/cm-2，耐贮运。

预防草莓苗畸形果的方法措施：

- 1、根据当地实际情况选取畸形果少的品种，也可在主栽品种中混入花粉量多，育性好的品种起到辅助授粉的作用。
- 2、合理调控温、湿度，棚室内注意通风换气，根据草莓所处时期调整浇水周期和浇水量。授粉受精的临界温度为11.7℃，适宜温度为13.8~20.6℃。花粉发芽以25~27℃为好，20℃或35℃时，也能有50%的花粉发芽。草莓花药开裂的适湿度为30%-50%，柱头受精和花粉发芽的适湿度为50%-60%。
- 3、合理施肥，尽量少施或不施纯氮肥，开花期前可叶面喷施一次硼肥，及时补充其他中微量元素叶面肥。
- 4、花期禁止喷施药剂，花前要做好预防，开花后若有病株，及时拔除，摘除病叶、花序，能不用药尽量不要用药。实在需要使用时，可选择烟熏剂。如果使用叶面喷雾，建议在下午两点以后在进行喷施，避开花粉开裂的时间段。

5、及时疏花疏果，疏除老叶、病叶、无效腋芽等，增加株间空隙，保证光照充足，充分利用养分。

6、棚室放置蜜蜂，辅助授粉。现在种植草莓的朋友都会在棚内放置一箱蜜蜂，能够起到辅助授粉的作用，减少畸形果。但这蜜蜂也分种类，有土蜂、意蜂、熊蜂等。一些朋友说土蜂好，一些朋友说熊蜂好，但具体用哪种蜜蜂可以做一个对比试验。一个棚放置土蜂，一个棚放置熊蜂，统计两个棚的畸形果发生率即可对比出二者的优劣。