

揭秘防治番茄溃疡病新疗法青枯立克

产品名称	揭秘防治番茄溃疡病新疗法青枯立克
公司名称	潍坊科盛生物农药有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	奥丰:奥丰 瓶:瓶 山东潍坊:山东潍坊
公司地址	寒亭区开元街道富亭街鑫堡御苑一号楼门头房6号
联系电话	13953605848

产品详情

番茄溃疡病属于细菌性病害，高温情况是发病高发期，随水传播，种子带菌是远距离传播的主要途径，农事操作也可接触传播。病菌可从各种伤口侵入、气孔或水孔侵入，尤其是暴风雨后病害明显加重。

症状：幼苗染病，叶柄或胚轴上产生凹陷坏死斑，横剖病茎可见维管束变褐，髓部出现空洞。成株期染病常从植株下部叶片边缘枯萎，逐渐向上卷起，随后全叶发病，叶片青褐色，皱缩，干枯，垂悬于茎上而不脱落，似干旱缺水枯死状。茎部出现褪绿条斑。茎维管束褐变，后期下陷或开裂，茎略变粗，生出许多疣刺或不定根。湿度大时，有污白色菌脓溢出。果实染病，果面上形成圆形的病斑，呈白色，多隆起，单个病斑较多，大小基本均匀一致，中间有一褐色小点，病斑不可去除。溃疡病严重时植株枯死。

防治方法：对生产用种严格检疫，不使用带病种子。生产上提倡与非茄科作物进行三年以上轮作，采用高垄或高畦栽培。7-8月进行高温闷棚。及时中耕培土，早搭架。农事操作要在田间露水干后进行。病株要及时拔除深埋或烧毁，并用生石灰对病穴进行消毒。喷施300倍青枯立克+600倍沃丰素能有效预防番茄溃疡病的发生，杀菌预防的同时补充番茄生长所需的中微量元素等营养物质。每隔7天喷一次，连喷3-4次。

植株发病初期，可用300倍青枯立克+600倍沃丰素+1000倍大蒜油喷雾防治。在番茄定植后，视病情每隔7-10天喷一次。穗果膨大初期，进入发病高峰期。若病情严重，可适当提高浓度，用150倍青枯立克+600倍沃丰素+1000倍大蒜油+72%农用硫酸链霉素可溶性粉剂3000倍液进行全株喷淋，也可以进行灌根。