

防治枣树轮纹病用什么药特效药靓果安

产品名称	防治枣树轮纹病用什么药特效药靓果安
公司名称	潍坊科盛生物农药有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	奥丰:奥丰 瓶:瓶 山东潍坊:山东潍坊
公司地址	寒亭区开元街道富亭街鑫堡御苑一号楼门头房6号
联系电话	13953605848

产品详情

枣树轮纹病病菌以菌丝、分生孢子器和子囊壳在病果或病枝上越冬。第二年气温达15℃以上时，遇降雨孢子即散发，初期侵染幼嫩枝条。孢子靠风雨传播，从皮孔和伤口侵入。7~8月孢子数量达到高峰，危害枣果。枣树轮纹病菌具有潜伏侵染和再侵染特性，幼果被病菌侵染不会立即发病，病菌在果皮组织或果实浅层组织中潜伏期长达60~80天，果实停止生长后，在枣果转色期或变白期发病。着色期达到发病高峰，果实发病后2~7天脱落，落地病果7~15天即可产生孢子进行再侵染。枣果晒干后和贮藏期仍然会继续发病。

治疗方案：

喷雾：《靓果安》150-200倍+《大蒜油》1000倍+《沃丰素》600倍+有机硅喷雾2次，每次间隔5-7天左右

灌根：病害严重的和弱势树体，使用《青枯立克》200倍+《沃丰素》600倍，灌于毛细根区，以灌透为准。树小于3年一瓶10-20棵树；大于3年一瓶5-10棵树；老、弱势树一瓶3棵树。

预防方案：

- 1) 萌芽前半个月：使用《溃腐灵》100倍液+有机硅进行全园喷施，杀灭病菌，营养树体。
- 2) 展叶期：使用《靓果安》300倍+有机硅喷雾2次，每次间隔10天；其中一次搭配《沃丰素》600倍。
- 3) 生理落果期：使用《靓果安》300-500倍+《沃丰素》600倍+有机硅喷雾。（保果）
- 4) 果实生长期：使用《靓果安》300-500倍+《沃丰素》600倍+有机硅进行喷雾2-4次，基本每次间隔10-15天。病害高发期或雨季来临前可配合喷施《大蒜油》1500倍或当地化学药。
- 5) 秋季采果后：使用《溃腐灵》300倍+《沃丰素》600倍+有机硅进行喷雾1次。

6) 落叶2/3后，使用《溃腐灵》100倍液+有机硅进行全园喷施，杀灭病菌，营养树体。

加强管理，多施微生物菌肥、农家肥，减少化学肥料使用量，增强树势，提高抗病力。彻底剪除树下的病枝条，集中烧毁，以减少病害的侵染来源。

中药制剂特点：

标本兼治，药肥双效（防病治病的同时营养复壮株体），无抗药性，可连续使用，无毒无残留，不影响绿色有机标准，任何时期均可使用，安全性高。