

早酥红梨树苗品种介绍 早酥红梨种植前景怎么样

产品名称	早酥红梨树苗品种介绍 早酥红梨种植前景怎么样
公司名称	泰安市泰山区华勤园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	华勤种苗:品质保证 苗木粗壮:无菌种苗 品种纯正:根系发达
公司地址	泰安市泰山区泰前街道
联系电话	18954889323

产品详情

早酥红梨树苗品种介绍 早酥红梨种植前景怎么样

华勤种苗基地是国家工商管理部门认证三证齐全，市级果树苗木推广单位，也是省农科院果树新品种种植推广，老品种改良试验推广单位，依托先进的技术支持所供应的果树纯度高，规格齐全，根系发达、苗木粗壮、基地常年大量供应【奥红一号红梨树苗】【早酥红梨树苗】本基地郑重承诺所出售的所有果苗都为客户终身免费提供技术服务 另为客户免费代办全国保湿邮寄 检验检疫证明。今年基地育苗奥红一号红梨苗50万棵、早酥红梨苗45万棵、华勤种苗热烈欢迎全国朋友来基地实地考察洽谈业务。

“早酥红梨”、早酥梨的芽变。梨花粉红色，幼果至成熟后果皮如红缙，果面光滑，有光泽。其品种的优点是，早酥红梨外观优美，其叶红润，嫩枝紫红，其花艳红，果红色，具有良好的观赏价值，也可作生态观光果园的品种。该果实含有天然红色紫色等色素，同时也具有一定的健康美容功效。在早酥红梨种植期间，要针对其林果类的特性，分析栽培和管理过程中的各个技术要点，并保证有正确的管理方法，技术应用和实施要点的合理执行，不仅能降低劳动强度，也能促进生产效率的稳步提升。

1 早酥红梨主要性状

早酥红梨具备植物学特征，其树姿更为直立，枝干为红褐色，果实成熟之后，叶为绿色。早酥红梨果实具备的经济性状，其生长的果实也比较大，呈卵圆形，全果色泽更鲜红。单果重250克到300克左右，七月中旬成熟，糖度18个百分点，其中的果梗比较长，果肉为白色，不仅汁液较多，味道也更为淡甜。果实具备的贮藏性和其它早酥梨相似。其还存在生长结果习性，植株生长过程中，整体长势更强，其萌芽力也较好，挂果时间比其它梨果要早。一般情况下，是以短果枝为主。为了在栽培后获得更高产量，需要人工疏花疏果这项工作。早酥红梨还具备一定适应性，在不同区域，能够达到高产、稳产、抗旱、

抗寒效果，适合在南北方种植，可以扩大和推广栽植面积。

早酥红梨树苗品种介绍 早酥红梨种植前景怎么样

梨树春梢期做好4点管理措施，严防梨茎蜂咬断嫩梢春天梨园新梢抽发不久，嫩梢就被咬断梢头的现象发生较为普遍，有农户来咨询是什么虫危害，该怎么防治?一般梨树嫩梢被截断，基本可判断是梨茎蜂为害造成。梨茎蜂在江西梨树栽培区普遍发生，是为害梨树新梢的主要害虫，有些园区连年受害，发生严重的新梢被害率高达80%以上，满园断梢累累，影响幼树树冠成形，成年数结果枝无法形成，对树势和产量影响极大。下面与大家聊聊梨茎蜂的危害症状、发生规律及防治方法，以供参考

一、梨茎蜂为害梨树有哪些症状?

梨茎蜂又名折梢虫、剪枝虫，属膜翅目、茎蜂科。梨茎蜂以成虫利用锯状产卵器截断梨树嫩梢，被折断的新梢枯死，嫩梢截断处下部留有2-3厘米短桩，便于梨茎蜂产卵繁殖。轻轻撕开茎秆，会发现米粒形状的卵1粒

梨茎蜂每锯断1根新梢只会产卵1粒，1头雌成虫能为害20-30个新梢，卵孵化后幼虫在短桩新梢髓部蛀食，造成受害部位枯死，严重影响树木正常生长梨茎蜂幼虫取食

蛀食完后会蛀入上年生枝条髓部，在距离分叉处1厘米处扭转虫体，头朝上结茧，进入越夏入冬状态。梨茎蜂老熟幼虫休眠状

二、梨茎蜂的发生规律

梨茎蜂在南方一年发生一代，以幼虫或蛹在被害枝内越冬，翌年2月中下旬化蛹，3月下旬梨树开花期成虫羽化。羽化后3-5天成虫从被害枝内飞出，随后交配产卵，卵经7-10天孵化后蛀食嫩梢，6-7月份，幼虫老熟后，在被害枝内做茧越冬。

据观察，梨茎蜂成虫出枝时间持续6-8天，出枝后当天就可对梨梢产生危害;随着成虫出枝量的增加，为害程度加重。梨茎蜂

梨茎蜂成虫出枝期与早春气候及梨树抽梢长度有密切关系。从3月底至4月上中旬，若天气晴朗、日最高气温骤升至20 以上时，则成虫大量出枝，为害新梢。梨树抽梢至5厘米长时，成虫开始产卵为害;随着新梢的生长，危害加重;当新梢长至8-12厘米时，达到危害高峰;当梢长超过15厘米时，危害骤减。

三、防治梨茎蜂有哪些方法?

因梨茎蜂幼虫为害隐蔽在梨枝内，同时新叶嫩弱，梨处于花期，用药容易产生药害，给防治带来很大困难。在梨树生产上常采用以下措施：

梨树花期与梨茎蜂为害

1、药剂防治

抓住梨茎蜂出枝期，在羽化出枝后至产卵为害前即时施药，防治药剂可选择菊酯类(高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯)、阿维菌素等;当新梢长至8-12厘米时，应特别注意防治。喷药时要注意均匀喷施树冠内外、叶片正反面。喷药尽量避免开花盛期，一般提早于花前或延至落花。

2、捕杀成虫

在梨树抽春稍时，利用成虫喜停歇叶背的习性，于早晚和阴天摇动树枝，振落成虫，进行人工捕捉成虫。

黄板粘杀

3、悬挂粘虫板

在梨树初花期每亩悬挂20厘米*30厘米黄色双面粘虫板12块，悬挂高度离地面1.5-2米。粘虫效果最佳，每块粘虫板可粘杀成虫1000只，若因梨茎蜂密度大，粘虫板粘满后要及时更换粘虫板。

4、连年剪除虫梢

冬季清园时剪除当年危害形成的枯枝，春季及夏季剪除被害新梢，并销毁，以减轻第二年的虫源基数。