

# 早酥红梨树苗育苗产地 华勤种苗品种纯正根系发达

产品名称	早酥红梨树苗育苗产地 华勤种苗品种纯正根系发达
公司名称	泰安市泰山区华勤园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	华勤种苗:品质保证 苗木粗壮:无菌种苗 品种纯正:根系发达
公司地址	泰安市泰山区泰前街道
联系电话	18954889323

## 产品详情

早酥红梨树苗育苗产地 华勤种苗品种纯正根系发达

华勤种苗基地是国家工商管理部门认证三证齐全，市级果树苗木推广单位，也是省农科院果树新品种种植推广，老品种改良试验推广单位，依托先进的技术支持所供应的果树纯度高，规格齐全，根系发达、苗木粗壮、基地常年大量供应【奥红一号红梨树苗】【早酥红梨树苗】本基地郑重承诺所出售的所有果苗都为客户终身免费提供技术服务 另为客户免费代办全国保湿邮寄 检验检疫证明。今年基地育苗奥红一号红梨苗50万棵、早酥红梨苗45万棵、华勤种苗热烈欢迎全国朋友来基地实地考察洽谈业务。

“早酥红梨”、早酥梨的芽变。梨花粉红色，幼果至成熟后果皮如红缙，果面光滑，有光泽。其品种的优点是，早酥红梨外观优美，其叶红润，嫩枝紫红，其花艳红，果红色，具有良好的观赏价值，也可作生态观光果园的品种。该果实含有天然红色紫色等色素，同时也具有一定的健康美容功效。在早酥红梨种植期间，要针对其林果类的特性，分析栽培和管理过程中的各个技术要点，并保证有正确的管理方法，技术应用和实施要点的合理执行，不仅能降低劳动强度，也能促进生产效率的稳步提升。

### 1 早酥红梨主要性状

早酥红梨具备植物学特征，其树姿更为直立，枝干为红褐色，果实成熟之后，叶为绿色。早酥红梨果实具备的经济性状，其生长的果实也比较大，呈卵圆形，全果色泽更鲜红。单果重250克到300克左右，七月中旬成熟，糖度18个百分点，其中的果梗比较长，果肉为白色，不仅汁液较多，味道也更为淡甜。果实具备的贮藏性和其它早酥梨相似。其还存在生长结果习性，植株生长过程中，整体长势更强，其萌芽力也较好，挂果时间比其它梨果要早。一般情况下，是以短果枝为主。为了在栽培后获得更高产量，需要人工疏花疏果这项工作。早酥红梨还具备一定适应性，在不同区域，能够达到高产、稳产、抗旱、

抗寒效果，适合在南北方种植，可以扩大和推广栽植面积。

**梨树白粉病的危害症状、传播途径及防治方法**梨树白粉病是一种主要危害叶片的病菌，在全国各地均有发生，降低了梨的产量，影响了农户们的种植效益。为了帮助农户们更好的应对梨树白粉病，总结了其危害症状、传播途径及防治方法，供大家参考。

**危害症状：**

梨树白粉病最初在叶背面产生圆形的白色霉层，继续扩展成不规则白粉状霉斑，严重时布满整个叶片，白色霉层即病原菌的外生菌丝体、分生孢子和分生孢子梗。生白色霉斑的叶片正面组织呈黄绿色至黄色不规则病斑，严重时病叶萎缩、变褐枯死或脱落，后期白粉状物上产生黄褐色至黑色小颗粒。传播途径：

梨树白粉病的病菌主要以闭囊壳在落叶上或黏附于短枝梢上越冬。第二年夏初子囊孢子成熟，孢子借气流、风传播，进行侵染，在病叶上生成分生孢子后可借风雨行多次再次侵染，一般在7月开始发病，8~9月为发病盛期。

春季温暖干旱，夏季凉爽，秋季晴朗的年份病害易流行。树势衰弱，树冠密闭，通风透光不良，土壤黏重，偏施氮肥或肥料不足，特别是钾肥不足或管理粗放的梨园均有利于发病。荏梨、秋白梨、苹果梨、康德梨发病重，其他品种一般受害较轻。

**防治方法：**

- 1、清除病源，在冬季修剪或梨树发芽时，剪除病枝、病芽和病梢，秋、冬季清除落叶并集中烧毁。
- 2、合理控制种植密度，疏剪过密枝条，控制灌水，避免偏施氮肥，增施磷钾肥，提高树体抗病力。
- 3、在梨树发芽前杀死树上的越冬病菌。
- 4、在苗圃中，梨幼苗发病初期，可药物防治。