

早酥红梨树苗非常丰产的红梨品种

产品名称	早酥红梨树苗非常丰产的红梨品种
公司名称	泰安市泰山区华勤园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	华勤种苗:品质保证 苗木粗壮:无菌种苗 品种纯正:根系发达
公司地址	泰安市泰山区泰前街道
联系电话	18954889323

产品详情

早酥红梨树苗最丰产的红梨品种

华勤种苗基地是国家工商管理部门认证三证齐全，市级果树苗木推广单位，也是省农科院果树新品种种植推广，老品种改良试验推广单位，依托先进的技术支持所供应的果树纯度高，规格齐全，根系发达、苗木粗壮、基地常年大量供应【奥红一号红梨树苗】【早酥红梨树苗】本基地郑重承诺所出售的所有果苗都为客户终身免费提供技术服务 另为客户免费代办全国保湿邮寄 检验检疫证明。今年基地育苗奥红一号红梨苗50万棵、早酥红梨苗45万棵、华勤种苗热烈欢迎全国朋友来基地实地考察洽谈业务。

“早酥红梨”、早酥梨的芽变。梨花粉红色，幼果至成熟后果皮如红缙，果面光滑，有光泽。其品种的优点是，早酥红梨外观优美，其叶红润，嫩枝紫红，其花艳红，果红色，具有良好的观赏价值，也可作生态观光果园的品种。该果实含有天然红色紫色等色素，同时也具有一定的健康美容功效。在早酥红梨种植期间，要针对其林果类的特性，分析栽培和管理过程中的各个技术要点，并保证有正确的管理方法，技术应用和实施要点的合理执行，不仅能降低劳动强度，也能促进生产效率的稳步提升。

1 早酥红梨主要性状

早酥红梨具备植物学特征，其树姿更为直立，枝干为红褐色，果实成熟之后，叶为绿色。早酥红梨果实具备的经济性状，其生长的果实也比较大，呈卵圆形，全果色泽更鲜红。单果重250克到300克左右，七月中旬成熟，糖度18个百分比，其中的果梗比较长，果肉为白色，不仅汁液较多，味道也更为淡甜。果实具备的贮藏性和其它早酥梨相似。其还存在生长结果习性，植株生长过程中，整体长势更强，其萌芽力也较好，挂果时间比其它梨果要早。一般情况下，是以短果枝为主。为了在栽培后获得更高产量，需要人工疏花疏果这项工作。早酥红梨还具备一定适应性，在不同区域，能够达到高产、稳产、抗旱、抗寒效果，适合在南北方种植，可以扩大和推广栽植面积。

梨苗想要高产秋季管理如下管理要到位：

一、吊枝：梨树枝软，在盛果期大量结果时，果枝多数下垂生长，在结果过量的情况下易劈裂。可在中干绑上长椽，将梨树结果枝用绳吊于椽上，以防劈裂。也可采用带杈的长木杆将梨结果枝在中部撑起，防止因结果过重而劈枝。

二、病虫害防治：在秋季按病虫害发生情况，每15~20天对轮纹病、黑星病、霉心病危害的梨园喷一次50%的多菌灵可湿性粉剂500~600倍液或70%甲基托布津800倍液，以控制病情。

三、追肥浇水：由于梨新梢一年只有一次生长高峰，大致在7月份新梢停止生长，因而梨新梢生长不存在控制现象。为了促进果实的膨大,完善花芽分化程度，种植户可在果实迅速生长期追施一次速效性肥料，每株根据树的大小施氮磷钾复合肥0.3~1.5千克，并根外追施0.3%的磷酸二氢钾1~2次。追肥后及时浇水，以加速肥料的转化，促进肥料的吸收利用。在采果后及时施用基肥，补充树体因大量结果所消耗的营养，可按树的大小每株施有机肥50~250千克，过磷酸钙5~10千克、硝酸铵1~2千克，施肥深度要达25厘米以下。在落叶后土壤封冻前，全园灌一次越冬水，以利树体安全越冬。

四、刮老皮：梨树皮是多种病虫害的越冬场所，在树皮裂缝越冬的病虫害主要有：梨小食心虫、梨星毛虫、梨蚜、梨花网蝽、梨椿象及梨木虱等。在此隐避的多种病虫害是次年病虫害的发生源，同时由于梨树老皮缺乏迟展性，从而束缚树体的加粗生长。所以在秋季应刮除老皮，减少病虫害越冬基数，为来年的病虫害防治打好基础。

五、清园：在落叶后，要及时清扫果园落叶，清除枯枝，摘除僵果，铲除果园周围的杂草，集中烧毁。对于吊枝绳和顶枝杆在用后应及时烧毁，对于采果筐、果箱要喷杀虫剂后再使用。

六、耕翻：在土壤封冻前，要对全园进行一次深翻，深度在30厘米以上，以熟化土壤，促进根系生长