

早黄无花果苗批发价格、早黄无花果苗多少钱一棵

产品名称	早黄无花果苗批发价格、早黄无花果苗多少钱一棵
公司名称	泰安开发区禄源园艺场
价格	.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13375383809

产品详情

早黄是夏秋果兼用品种。秋果扁圆形，单果重50~70克；果成熟时黄色、果顶不开裂；果肉草莓红色；可溶性固形物含量15%~17%，甚至更高，风味浓甜。品质上等。在原产地新疆阿图什夏果7月上旬始熟，秋果8月中下旬成熟。该品种果中大，品质好，丰产，鲜食加工均佳。该品种不宜在新疆南部以外地区栽培。

果实大，扁圆形，两端平，平均果重53.3克，最大果重69克。完全成熟后果皮呈黄色，有白色椭圆形果点。果肉淡黄色，肉质柔软，味甜，品质中上。第一次果成熟期在7月中旬，第二次果成熟期8月中旬到9月下旬。10月下旬落叶。

早熟品种新疆南部阿图什特有早熟无花果品种。夏秋果兼用品种，秋果扁圆形，单果重50-70克，果熟时黄色，果顶不开裂，果肉淡黄色，可溶性固形物含量15% - 17%或更高，风味浓甜，品质上。树势旺，但树姿开张，萌枝率高，枝粗壮，尤以夏梢更盛，在原产地新疆阿图什，夏果熟期7月上旬，秋果8月中下旬成熟。

该品种果中等大，品质佳，丰产性强，为鲜食加工用优良品种。但在江苏、南京、河南许昌、新乡等地引种，表现徒长、结果少、成熟期推迟现象，因此，内陆引种必须采取控制徒长等配套栽培技术措施，以保证果实产量和品质。

我们要说的就是无花果在泥盆中的扦插技术，无花果本身可以在20厘米的泥盆中进行的，这样的泥盆不仅价格便宜，而且使用起来还非常的方便，渗水以及透气的效果非常好，在扦插的时候，我们尽量选择干净河沙或者是建筑用沙，以及有机质含量比较高的腐殖土，这两者在使用的時候都可以在太阳之下在进行暴晒以及干透，并且尽量将沙土中的大石块进行剔除，使基质更加的均匀，然后在两者等体积混均，在装在盆中以备后患。

再从三个月月上旬到五月份的初期，插穗将取得成年树上的饱满，在无病枝条，保留两个以上的节，在剪成20厘米的小段，上下均匀的平剪，在经过自来水的浸泡之后，在用废旧的牙刷或者软毛刷去表面的灰尘。再将枝条微倾的分布到盆体当中，将埋入土中的枝芽在表面上露出一小部分都应该保留一个小节

。在压实之后再次进行表面覆盖一层大约1CM厚的沙子，浇透水。

由于说无花果的耐盐性非常强，耐瘠薄，对土壤的要求不高，那么就可以根据实际情况来决定是否施用基肥，在移栽之后，就可以在苗床上进行搭建比较简单的小棚子，棚子的高度可以根据自己的幼苗进行适当的搭配。在根据棚子内的幼苗的恢复以及生长的情况将会逐渐的扩大到通气口上，在后期将可以在小棚子的两端进行打开。或者说是完全地撤进小棚子里面。

在无花果的枝条上进行选择，在选择健康粗壮的枝条上，4月底再开始进行流动的枝条扦插成活率非常高，并且生长快，在同时，对母树上的截面非常粗壮的伤口上应该涂抹上油漆，并且会减少伤流防止抽干。在扦插的成活后水分的管理是至关重要的，并且在新生长的幼根会非常的幼嫩，抗性非常的差，即不耐劳也不耐旱，并且一旦出现叶片轻微萎缩的时候要及时的进行喷水。假如说是全部的叶片会发生萎焉。不过这一点还是非常重要的，就是连续的浇水将会造成幼根的腐烂，导致幼苗的死亡。在炼苗的时候我们可以选择将盆体搬放在没有阳光进行直晒的地方。

在室外进行移植的时候要主要的就是水分的管理必须要是无花果的幼苗以及培育的主要任务，假若顶芽在停止生长，说明我们的土壤将会干旱，特别是在当下的部叶片是出现萎缩的时候应该进行及时的灌水，以免会造成落叶，假如说是遭到持续的阴雨，应该进行持续的排水，不然将会出现根部向地面生长的现象，所以会影响根的固定效果，在造成倒树。