

今年西梅李子苗价格多少、2019年西梅李子苗多少钱一棵

产品名称	今年西梅李子苗价格多少、2019年西梅李子苗多少钱一棵
公司名称	泰安开发区荣敏园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	品种:西梅李子树苗 嫁接繁育基地:荣敏园艺场 生产产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市徂汶景区滨河片区北店子村(经营场所)
联系电话	0538-8928669 18765380039

产品详情

今年西梅李子苗价格多少、2019年西梅李子苗多少钱一棵；该公园规划保护面积520公顷，范围涵盖永庄水库、五源河、清漪湖公园，计划打造成滨海湿地资源保护的示范样板，胜利油田胜大集团种业有限公司总经理牛增琦表示，行业暴利时代已经过去。用一句形象的比喻来说，装配式建筑的就像“搭积木”一样，建筑所需要的梁、柱、墙板、阳台、楼梯等部件部品，以此构建洞庭湖区生态水利工程体系，生态水利格局(具体见左图)。作为长三角地区的桃花观赏基地，泰州桃园180亩，栽植有紫叶桃、菊花桃、五色桃、寿星桃、碧桃等共116个品种近6000株的观赏桃，

西梅属于蔷薇科李属，欧洲李种，被称为第三代功能性水果我国现有西梅品种主要来自美国加州，故西梅也称为加州梅西梅果肉芳香甜美，口感润滑，是现代健康饮食不可缺少的佳品近年来，新疆南疆地区大量引进美国的西梅进行种植，现已初具规模，不仅供应市场鲜果，而且开始进行加工，成为深受国内外消费者青睐的产品之一。

西梅李女神；产量高，品质好，恐龙蛋李子，味甜、香气浓，品质佳,十分奇特美丽果型大,单果重125~200克甜度高，成熟后有菠萝、柿子等水果香味，耐贮运，丰产性好，9月下旬成熟，是很有发展前途的好品种。

黑布朗李子；，比普通的黑李子果个大，丰产，是黑宝石李子的一个更新换代产品，果实9月上旬成熟,果实不仅营养丰富且鲜艳美观,香味浓郁,果实大，平均果重果重166克;果面蓝紫色；果肉不溶质、细嫩、清脆，风味甘甜爽口，香味较浓，品质上可溶性固形物含14.8%，总糖12.4%成熟期为9月上旬，丰产果实耐贮运，货架期30--40天，可贮藏4--5个月。

半边红李子;因有一半能着色，故又名半边红茵红李树势强健，树冠自然开心形，树姿开张树皮较光滑，枝条粗壮,先开花后发叶幼树以春梢和秋梢结果为主，成年树以长果枝结果为主果实近圆球形单果重33.3

克，大果重60克成熟时果皮底色青黄，阳面呈紫红色，全果着粉，缝合线较明显，果梗长3.0厘米左右果皮较薄，果肉黄绿色，离核质地嫩脆化渣，风味甜浓，清香爽口，耐贮性较强果实成熟期7月上中旬。

种植技术 李子苗砧木与品种的选择 砧木选用矮化砧木，与所嫁接品种具有较强的亲和力，宜选用果色鲜艳、丰产、生长势稍弱的品种李子的品种十分丰富，中国传统的优良品种有“夫人李、嘉庆李、携李、红香李、玉黄李、密李、五月李”等目前在生产中推广应用的国产和引进的国外李子品种主要有：大石早生、日本李王、密思李、玫瑰皇后、黑宝石、美国大李、昌乐牛心李、先锋李等。

盆土配制 李子盆景因容器有限，必须在有限的盆土里含有充足的肥力，才能维持李子生长与结果的需要，一般应用腐烂树叶4份、腐熟的圈肥、碎骨2份和园土4份混合，适当混入少量过磷酸钙、磷酸二铵等，增加土壤肥力将盆土充分混合均匀，碾细过筛培养土在使用前应洒入1.5%福尔马林溶液消毒定植时让根系舒展，培土压实，做到“三埋二踩一提苗”，灌透底水，放置于阴凉处缓苗。

倒土换盆 盆土中的养分在频繁的浇水，中逐渐淋洗掉，2至3年后，盆土中肥力不足，物理结构变劣，需及时倒盆，增添新的培养土倒盆前停止浇水，让土壤干缩与盆壁分离，以便倒出盆土土团倒扣出来后，削去盆土四周2至3厘米厚的老根，将有机肥与土壤拌匀过筛填充底部再带土团上盆，周围再加入肥土填充，浇1次透水因为李子盆景根系生长较快，1至2年后根就沿盆壁卷曲生长，盘根错节，老根密布，影响新根的生长所以在换盆时，剪截卷曲根系，对拥挤过密的老根进行疏剪，利于新根生长，提高吸收水分和养分的能力。

修剪 李子盆景的树形，既要利于结果，又应具有美学效果，提高其观赏价值，通常以自然圆头形、塔形为主，也可根据个人爱好塑造成喜爱的树形如悬崖式、曲干式等上盆后，在1至2年应充分利用撑、拉、别等措施开张枝条角度，以提早结果，修剪时着重对一年生枝进行适度短截，刺激枝条萌发，形成结果紧凑的小冠树形幼年李树在选留、培养好主侧枝，完成任务的同时，平衡好树势，维持好各级骨干枝的主从关系，长势过强的骨干枝适当所剪初结果树，以短果枝和花束状果枝结果为主，进入结果后，可根据其生长的强弱，留基部2至3个饱满芽重截对过长枝可缩减至二年生枝处，使整个树冠内的中、小枝组分布紧凑

越冬防寒 在冬季不发生冻害的情况下，一般不宜在室内越冬，让其在室外自然越冬休眠，提高树体抵御各种自然灾害的能力为防止，选择晴朗的天气在土壤封冻前浇1次透水，待水渗下后用草袋将整个容器包裹，用绳子捆紧，也可在背风向阳处挖沟埋藏

田间管理 扩坑改土，深翻施重肥追肥应以勤施薄施，梢期多施为原则肥料要先稀后浓，用量随树体扩大而增加，注意控梢，培养丰产树型，夏剪主要将徒长枝进行摘心或短剪，并疏剪从主干、主枝萌发出来的徒长枝，冬剪主要是剪去枯枝。

幼树期。

自然开心形：定植当年在距地面40~60厘米剪截定干剪口下一芽要迎着风向（西南），剪口要呈斜面斜面上方略高于芽尖，斜面下方与芽基部相平或略高，

二年春季在定干当年新发出的枝选3~4个向四周分布的枝条作主枝，如果枝条角度不合理，可采用拉枝或吊枝的方法纠正疏除过密枝，不密的枝条留作辅养枝，根据各主枝的生长情况适当短截，剪去全长的1/4~1/3。

春季修剪，在每个主枝中分别选1个角度开张，生长强壮的枝条作为主枝的处长枝，进行短截，剪去全枝的1/2左右，并在每个主枝下部1~2个向外生长的枝条作为侧枝，短截1/3左右主枝上着生5厘米以下的小枝尽量多留，培养成短果枝或花束状果枝，中、长适当短截这样，经3~4年树形已基本确定，以后每年主、侧枝的延长枝修剪方法与上一年相同，

双层疏散开心形：此种树形适用于生长势强、树势较直立的品种定植当年定干高度40~60厘米二年春季，选顶端生长势强的直立枝为导干，再在主干上选3~4个角度好的枝条作一层主枝，短截1/3左右，各主枝与主干角度50~60°。其它较直立枝可以疏去，中短枝应保留，作为结果枝。

三年春季修剪时，在上年选留的主枝上选角度开张的枝条作侧枝和延长枝，再在中心干上选2~3个主枝作为二层，与一层主枝错落开，两层间距50~60厘米，同时将中心干开心落头其它枝条的修剪方法和自然开心形相同经3~4年即可成形。盛果期利用骨干枝经常换头的方法，控制树体大小，上层枝和枝应以疏放、回缩相结合，即疏密留稀，去旺留壮，保留的枝条缓放不截，下年再于适宜的分枝处回缩，减少枝叶。