

2019甜蜜蓝宝石葡萄苗栽培方式及品种介绍

产品名称	2019甜蜜蓝宝石葡萄苗栽培方式及品种介绍
公司名称	平度市农泽园艺场
价格	6.00/株
规格参数	农泽苗木:甜蜜蓝宝石 纯度:100% 等级:一级无菌种苗
公司地址	山东省青岛市平度市大泽山镇三山东头村226号 (经营场所)
联系电话	13678872012

产品详情

名优品种，易种易管理，保证纯度，保证成活率，免费技术支持！选择农泽，无菌种苗，专业诚信！

随着国家对“田园综合体”乡村新型产业发展的推动，乡村旅游、亲自采摘等项目蓬勃发展，葡萄因具有结果早、适应性强、收益高的特性成为采摘园建设的重要一环。

那么，如何选择品种呢？

品种的选择是基础，品质是关键！葡萄的品种本没有明显的好坏之分，每个品种各有优缺点，所以不是哪个品种好，而是哪个品种适宜的问题！

我们一样是面朝黄土背朝天，起早贪黑的奔波在这片土地，所以深知农民朋友的不容易！一朝种植，多年风雨！品种的选择必须因地制宜，因人而异！

第一、什么是因地制宜？

每个葡萄品种都具有各自所需的气候条件，比如有些品种在北方表现好，在南方就出现大小粒、裂果等问题，所以首先要根据自身实际的地理环境来选择品种！其次是要考虑当地的市场因素和消费水平，比如当地认可大粒品种那么小粒品种就不一定好卖，即使当地大粒品种已经发展很多，在规划品种时依然要把这类品种作为稳产保收益的主栽品种来安排，因为这类品种在当地有了规模效应，无论是市场还是收购渠道都很成熟。然后要搭配一些差异化品种来创造高收益，这样才能实现风险与收益的均衡！

第二、什么是因人而异？

品种好不好不一定种的好，各品种没有十全十美的，风险与收益共存！但不论哪个品种，优质的果品从来都不愁卖！而品质的关键在于管理！很多农民朋友会问“葡萄品种容易管理吗？”葡萄容易管理，但也绝不是像种豆子一样！广大朋友要结合自身所具备的管理经验来选择，尤其是新手，切不可盲目跟风！其次要结合自己的销售渠道，安排高、中、低档品种，不盲信，要创新思路，扎实管理，而不是遇到问题就想着“换品种”来解决！zui后，不要盲目求早！极早熟品种上市早，价格有一定优势，但多以小粒品种为主，目前也没有一个真正自然大粒的极早熟品种。

2019年能够帮助广大农户找到创造经济效益突破口的新品种当属甜蜜蓝宝石葡萄！该品种具有大粒丰产，好管理同时口感非常甜的优良特性，加上外观独特，十分高档，目前国内种植规模相对较小，市场竞争压力小，售价高，效益好，正是广大农户作为销售突破口的差异化上佳品种！以高档蓝宝石葡萄的销售拉动采摘项目以及客商的关注，带动整个葡萄品种的销量提升，从而摆脱困境，获得收益！

甜蜜蓝宝石葡萄苗在国内热度非常高，已结束了刚开始广大农户朋友保持观望的阶段，进入高速发展的新阶段，这将是下一个十年流行的葡萄品种，也是目前葡萄种植的有利风口，种则收益，不种遗憾！切莫错失良机！

一、甜蜜蓝宝石性状详解：

1.果粒大小：10克左右，自然无核

2.果型：长水滴形，果顶凹陷

3.颜色：果皮蓝黑色,果粉厚

4.果肉：脆甜，甜度高

5.香型：无香味

6.果皮：皮薄无涩味，极易连皮吃

7.耐拉力：极耐储运

8.长势：强旺，成型快

甜蜜蓝宝石抗性：甜蜜蓝宝石易栽培，果粒抗炭疽病、黑痘病、白腐病和白粉病，但叶片较不抗霜霉病，所以南方宜避雨栽植。甜蜜蓝宝石不用激素拉穗、不用激素脱籽、不用激素膨大、穗不紧密而省工。

二、甜蜜蓝宝石葡萄葡萄各成长时间肥水管理

1、伤流期（树液活动期）由树液活动开端，至芽开端萌发中止。当土温升至6—9 时葡萄根系开端活动，将很多的养分物质向地上部运送，供应葡萄发芽之用。由于葡萄茎部安排疏松导管粗大，树液活动旺盛，若植株上有创伤，则树液会从创伤处流出体外，称为伤流。因而，避免伤流期修剪和形成创伤，加强松土，进步地温，确保土壤一定的湿度和足够的矿质养分。

2、萌发及新梢成长时间 从芽眼萌发到开花始期约40天左右。当昼夜平均温度稳定在10度左右时，芽眼开端萌发。约2周后，新梢成长速度加快，开花前到达成长顶峰。此期各器官均处在旺盛成长阶段，也是奠定当年成长成果的预备阶段，因而，有必要及时追施氮磷钾等肥料如每亩冲施5-8公斤。为了节省养分，还应及时进行除荫、定芽、合理调理负载量的作业。

萌发及新梢成长时间管理关键：

清园，对上年秋后没有及时清园或清园不的园中的杂草、枯枝等杂物悉数清除出园，焚烧或深埋处理。再次全园喷洒清园药，消毒防霜冻阻止越冬病毒着落于树体繁殖。

洒水，多雨时节土壤湿度较大可不浇，洒水后待土壤松懈后，中耕保墒。

抹芽，在冬芽萌发期到展叶前将各部位的无效芽、过密芽及前出双芽的副芽悉数抹去，芽量约占方案留新梢量的120% - 130%。

追肥：第一次芽前追肥：对花穗分解和前期成长有作用，每亩冲施水冲肥5-8公斤办法是结合松土，在植株的根际周围浅沟冲施。

3、开花期 从开端开花到谢花，约5—14天。开花期的适合气温为25—32℃，假如温度低于15℃，则不能正常开花与受精。因而花前花后有必要追施含黄腐酸类肥料，防寒促进受精坐果，及时绑蔓、摘心，除副梢，改进通风透光条件，并对雌能花种类及授粉不良种类进行人工辅佐授粉。

管理关键：

葡萄开花前5天环扎后喷施硼肥促花保果肥，操控抽条疯长进步坐果率。另要恰当操控肥料和水分供应。

摘花序。开花前中止成长的弱枝上的花序悉数摘去，长势中庸枝条留一穗花序。

花絮整形。去掉花序岐肩，花前3-5天摘去花序先端1/5。

除卷须、绑枝蔓。对新梢卷需求及早掐除，及时绑缚固定新梢避免风害。

防病虫。花前喷施2000倍波尔多液或50%多菌灵500倍液。一起喷20%氯虫苯甲酰胺1500倍液，避免灰霉、黑痘等病害和斑衣蜡蝉等虫灾。喷施农药时有必要参加一袋增效剂来进步药效。

4、浆果成长时间 自子房开端膨大，到浆果开端变软上色曾经中止。此期养分成长敏捷，并进行花芽分解，养分物质消耗较多，应及时增施氮、钾、钙、硼、锰和锌肥，每亩冲施水冲肥2—5公斤，一起叶面喷施叶面肥2—3次，促进果实膨大、上色、增甜，增重，一起恰当操控新梢成长；此刻正值高温多湿时节，要加强病虫防治，坚持青枝绿叶，以进步光合出产能力，确保树体需求。

5、浆果老练期 自果粒开端变软上色至老练中止，约20—30天。此刻浆果体积不再显着增大，首要是养分物质的累积的转化，果实上色变软，酸度削减，糖分添加。此期浆果很多堆集糖分，新梢逐步木质化，花芽持续分解，根部开端储藏养分，因而，要注意增施养分，每亩冲施水冲肥来15—20公斤，喷施叶面肥2—3次，因其含有磷、钾、硼、钙等养分促进果实糖分累积，果实上色均匀，维护叶片，在多雨的情况下要注意排水，避免葡萄裂果和腐朽。

6、落叶期 从浆果生理老练到落叶中止。果实采收后，新梢木质化加快、叶片制作的养分由枝蔓和根系储藏起来。此刻加强田间办理，补施“月子肥”，早施基肥如有机肥，保持叶片的光合寿数和功率，促进枝芽充沛老练，以进步植株的抗寒越冬能力。

平度市农泽园艺场，几十年来，本着“推广一户，成功一户”的服务原则，以诚信为立身之本，获得众多农民朋友的支持与信任。我们深知广大农民朋友的不容易，怕买到假苗，怕不会管理，我基地培育的甜蜜蓝宝石葡萄苗，可实地考察，现场看果定苗，保证纯度，保证成活率，免费提供技术支持，可签订购苗合同！用企业的责任和担当帮助广大农民朋友在种植的致富路上开个好头！

