

香椿直播苗 批发多少钱一棵

产品名称	香椿直播苗 批发多少钱一棵
公司名称	泰安市泰山区华勤园艺场
价格	.30/棵
规格参数	华勤种苗:品质保证 原种母树分株:品种纯正 根生苗直播苗:规格齐全
公司地址	泰安市泰山区泰前街道
联系电话	18954889323

产品详情

香椿直播苗 批发多少钱一棵香椿直播苗

一、大棚香椿种植管理技术及种植设备介绍

设施栽培主要有小型塑料拱棚、保温塑料大棚、塑料薄膜日光温室等，冬春增温保温，以利椿芽提早萌发，提前上市。

(1) 整地施肥。大棚温室栽培香椿，需要精细整地施足底肥，深翻25厘米左右，一般每亩施优质腐熟农家肥500千克以上，过磷酸钙100千克以上。黄淮海地区10月下旬至11月初起苗。

(2) 选用优质苗木。1年生苗高60~100厘米，干粗1厘米以上，2年生苗高100~150厘米，干粗1.5厘米以上，组织充实，顶芽饱满，根系发达无病虫害，侧根长20厘米以上。

香椿直播苗 批发多少钱一棵香椿直播苗

(3) 栽植技术。香椿落叶后需要经过17天左右的自然休眠期，才能保证萌芽鲜嫩、纤维少、香味浓、品质好。所以起苗后应挖沟假植，根部埋土浇水，苗上稍盖草苫保温预防冻害，经过15~20天10℃以下自然低温使其完成自然休眠，再栽入棚内，也有先栽入棚内但不盖薄膜，待完成自然休眠后再扣膜保温。如山东10月下旬至11月上旬起苗假植，11月下旬定植在日光温室中；河北保定11月15日起苗栽植，小雪前后盖膜，最晚在11月底盖膜。栽植时南北行向，行距10~20厘米，株距4~5厘米，每隔1.5米左右留一个宽行作为土埂，以利浇水和行走方便。当年生苗每平方米栽100~150株，多年生苗每平方米栽80~120株。温室前坡下面栽矮苗，后坡下面栽高苗，中部栽中等高度的苗木。

(4) 栽后管理。扣膜后10~15天是缓苗期，应提高地温促进根系活动，白天气温保持在15~25℃，夜

间10 左右（最低温5 以上），地温8 以上，11月下旬至12月初要注意夜间盖草帘保温；经过40~50天开始萌芽，椿芽着色的气温在22 以上，现绛红色的芽，外观品质好，室温超过28 ~30 时，晴天中午扒开膜缝通风2~3小时；采收期保持白天气温18 ~25 ，夜温13 ~15 ，以促进椿芽生长。若室温低于4 ~5 时应生火加温，并于室内支小拱棚或在室外加盖双层膜及盖双层草帘保温栽植后的室内空气相对湿度保持在85%以上，萌芽后以70%左右为宜。空气相对湿度的调节措施有浇水喷水、放风排湿等。栽植时应浇水，每次采收前3~5天，应选择晴暖天的中午给苗木喷水，喷到叶面滴水为止。每采收一次应每平方米追施尿素250克并浇小水，或叶面喷1%尿素增加营养。盖帘保温期间，每天上午9时前后卷起草帘以利光照，下午4时前后盖上草帘保温，注意随时清除塑料膜上的灰尘及水珠，以免影响光照立春后光照过强时，中午可临时间隔盖草帘遮光，通过调节光照使香椿芽薹及复叶呈现红褐色，外观品质好。

（5）精细采收。温室香椿比较娇嫩，每次采收时必须用剪子剪或用刀片削下芽头，不要用手掰，以免伤及枝芽影响隐芽萌发而降低产量。

（6）揭膜平茬。谷雨前后采收结束时，树体内的养分几乎耗尽，可逐渐揭开薄膜通风降温，炼苗3~4天后起苗平茬栽到露地。当年苗留茬高10厘米，多年生苗留茬高15~25厘米，萌芽后选留1个壮芽培育苗干，其余萌芽抹除，搞好肥水管理、中耕除草和病虫害防治，为下年温室生产培育优质壮苗。其他管理要求与露地栽培相同。

可对插穗进行催芽处理，

共采收4--5次，每次采芽后要追肥浇水。塑料日光温室进行高密度栽植(亩栽3万株)，亩可产6000公斤香椿芽。加上香椿苗销售收入，产值可观。温室香椿很娇嫩，采收时不能用手掰，要用剪刀剪或用刀削。第1次采收时芽基部要留两片复叶，第2次采收侧芽时留2--3片复叶。

人们在选购苗木2月10日消息：2月6日，靖州苗族侗族自治县渠阳镇二凉亭村苗木市场，人们在选购苗木。植物组团的造型，我觉得不是很讲究盆景造型，而是要自然造型。戴元湖在部署工作时说，市委、市推进沿海百万亩生态防护林工程建设，其中新造成片林40万亩，改造现有成片林60万亩，为避免出现既当裁判员又当运动员的弊端，公园的所有权、权、权应分开行使。据刘兴荣介绍，在天宝村，像这样的林业共赢链还有很多，共同编织成了一条“绿色产业利益链”。

二、红油香椿露天种植管理技术以及如何建园

（1）园地选择

香椿栽培大致分零星栽植和成片栽植两种类型，选择海拔700米左右的低山区向阳坡地土层深厚的地方50种经济林果丰产栽培技术栽植，或在平原地区光照、排水良好的地方栽植，河流沿岸、沟谷冲积土、房前屋后、村边渠旁、路边沟边、田埂地头均可栽植。

（2）栽植方式和密度

大冠稀植栽培。行距6.0~8.0米，株距0.8~1.0米；在平原农田边或山区梯田堰边可单行栽植，株距1.0~2.0米。

矮化密植栽培。一般行距1.5~2.0米，株距0.5~1.0米；高密度栽植行距1.0米，株距0.2~0.3米。

丛状栽植。行距2.5~3.0米，丛距2米，每丛3株，丛内株距0.3~0.5米，呈三角形配置；或行距1.0米，株距0.5米，每穴栽2株；山坡地行距2.0米，株距1.0米，每穴栽3~5株，增加群体抗逆性。

(3) 栽植时期与方法

春季在土壤解冻后至发芽前，秋季在落叶后进行。栽植深度以超过苗木原土痕2~3厘米为宜，切忌窝根。栽前要挖坑或开沟，施足底肥；栽后浇水保墒。北方寒冷地区秋栽后要培土堆防寒，翌年春天萌芽长出后扒去土堆。香椿嫩叶馥郁芳香，鲜食、腌制均甘美爽口，实为蔬菜中的商品。每100克嫩芽含维生素C可达48毫克，此外，还含有丰富的胡萝卜素等。香椿一经定植后，勿须像草本蔬菜那样严格管理，一般任其自然生长即可达到采收目的。但采收时必须将萌发的嫩芽全部摘下，如果嫩叶基部留2~3新叶不采，则下方的潜伏芽不易萌发，从而影响产量。春季萌芽后，在香椿新梢尚未木质化前采收供食。采收标准以芽色紫红，芽长10~12厘米为准。一次采收宜早，采收10~15厘米嫩梢嫩叶，第二次采收20厘米长的嫩梢嫩叶，第三次采收时幼芽生长更快，可于芽长30厘米左右时采收。采收三次后不宜再采收，因为，此后嫩梢嫩叶生长快、硬化也快，即使采收也不堪食用。采时应根据树龄大小采取不同采法，即不仅考虑到当年产量，还应注意以后树形的发展。对栽后一年的树，留1.5~2米的主干只采收顶芽，促使侧芽生长；第二年可采收侧枝顶芽，促进二次侧枝生长；第三年后树干已定形，所有枝条顶芽都可采收。

浸种时间和方法同混沙催芽法，

当年椿芽采收后，应及时短截长枝，矮化篱垣，使篱垣高度保持在1米以下，并促发低平位侧芽。第二，椿芽采收后拆棚，回缩修剪，并追施以磷肥为主的混合速效液肥，切忌偏施氮肥。在夏秋雨水过多的年份，还应采取断根或喷施激素(如矮壮素等)进行矮化，以利翌年春棚催芽。

植绿要求是多种乔木、少种地被，主要以市树榕树种植为主，多种植大乔木，快速形成树荫。因而，鼓励农民种植市花和市树，同时加大宣传力度，连州市花和市树的知名度，也是让桃花和桂树更名副其实成为市花和市树的路子，盆仙白皮松目前，“盆仙白皮松”已经被新品种办公室授予新品种权，其繁殖主要为嫁接，适应范围与白皮松相似，此次会议由北京市园林绿化局、河北省林业厅、保定市联合组织召开。“我们也注意到了接待能力的不足，旅游配套设施有待完善。