

江苏法兰地草莓苗 乾纳瑞农业 法兰地草莓苗多少钱

产品名称	江苏法兰地草莓苗 乾纳瑞农业 法兰地草莓苗多少钱
公司名称	泰安市乾纳瑞农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13505388845

产品详情

如何在花盆里种植草莓

播种

草莓种子较小，播种时必须精细。zui好用筛过的细沙壤土混合一部分较细的腐殖质土填入花盆，在盆内播种。播前先喷透水，撒播后覆以筛过的细土0.5厘米左右，盆上用塑料薄膜覆盖，每天用细眼喷壶喷水，保持土壤湿润。在25 的温度下，法兰地草莓苗多少钱，播后15天即可开始出苗。在幼苗长出2片真叶时，进行分盆，4~5个叶片时，即可换大盆。

苗期管理

浇水 幼苗期不适于漫灌，可用喷灌的办法满足供水。苗长到6片真叶后，可采用小水漫灌，防上淤苗。

追肥小苗长到6片真叶时，可进行di一次追肥，以追施尿素为宜。可把尿素溶于水中制成稀肥喷施。di一次追肥，用量宜少。以后每20~30天追一次肥，随苗株的长大，用肥量可适当增加。

草莓的护理

草莓是很容易栽培的植物，可以移植。有时可能会发现植株有黄叶子，但是不要担心，只要摘除就可以了。在冬天，一直可以保留黄叶子，直到来年春季有新叶子长出后，再摘除死掉的黄叶子，并注意浇水，除草，和灭虫。还可以把草莓种在植物袋里，但一定要浇水均匀，防止鸟啄食草莓和虫害。植物袋里的泥土很容易变干，需要经常检查，保证泥土的湿润。

如果是小量种植，尽量不要使用nong药，可以使用大量兑水后的餐具洗涤剂喷洒;也可以在附近放上些香瓜皮，啤酒等等以引开蜗牛等软体爬虫害虫。

在秋天，要在植株上铺上一层土，法兰地草莓苗厂家，防止霜冻。等土壤上冻后，可以再在植株上铺3-4英寸厚的干草。到第二年的春天，当有新叶子长出后，再移去干草。等天气转暖，并稳定后，在移去植

株表层的覆盖土壤。但要在行间留一些干草，以防止野草的生长和保持土壤的水份。

如果家里有暖房，可以把草莓移到暖房中，江苏法兰地草莓苗，这样会更好。草莓也更容易结果。等草莓结果期过后，可以把它们移出暖房，放在室外过冬。从某种角度说，如果草莓植株经受一些霜冻的话，更利于来年提高产量。

草莓的种植有三年的周期。头一年仅能收获很少的草莓，第二年就会收获很多，但到了第三年或者三年之后，草莓的产量就要明显下降，需要把植株替换掉。

当草莓生长良好时，它会生出一种藤蔓，在藤蔓的端头又会生出新的小植株。当小植株长到3-4片叶子时，可以把它剪下，种在另外的花盆中，法兰地草莓苗供应，注意浇水。最好不要让第一年生的新植株结草莓，仅让它生长出更多的叶子。所以当发现一年新的草莓开花后，要把花摘掉。

同时不要忘记在植株上挂上小牌子，写上新柱的种植日期，以免日后忘记。摘除新植株上其他多余的藤蔓。如果草莓是种在院子地里的，还要注意除草。浇水的时候，注意不要把草莓弄湿。

草莓种植过程中斜纹夜蛾的危害症状及防治

1.危害症状

以幼虫咬食叶片、花蕾、花及果实，初龄幼虫啃食叶片下表皮及叶肉，仅留有透明斑的上表皮;4龄后咬食叶片，仅留主脉。

发生规律

山东草莓喜温，抗寒力弱，发生最适温度为28--32 °C，相对湿度75%-85%，土壤含水量20%~30%。成虫昼伏夜出，飞翔力强，对光、糖醋液等有趋性。初孵幼虫在卵块附近昼夜取食叶肉，留下叶片表皮，俗称“开天窗”，2-3龄开始转移危害，也仅取食叶肉。4-6龄的取食量占全代的90%以上，将叶片取食成小孔或缺刻，严重时可吃光叶片，并危害幼嫩茎秆。有假死性及自相残杀现象。

3.防治方法

清除杂草，摘除卵块及幼虫扩散危害前的被害叶。结合防治其他害虫，采用杀虫灯或性诱剂或糖醋液诱杀。药剂防治:根据幼虫危害习性，防治适期应掌握在卵孵高峰至低龄幼虫分散前，选择在傍晚施药，均匀喷雾叶面及叶背。在卵孵高峰期可选用5%氟虫脲乳油2000-2500倍液，或5%氟啶脲乳油2000-2500倍液等喷雾;在低龄幼虫始盛期选用10%三氟甲吡醚乳油1000倍液，或40%du死蟀乳油1000倍液等，均匀喷雾叶片正反两面。

1.危害症状

受害草莓植株根系出现很小的根结，侧生营养根增生，根系不发达，地上部分生长弱，叶片变黄，最终植株萎缩枯死，根系上有黄褐色到黑褐色的椭圆形病斑。

2.发生规律

在保护地栽培中，特别是在沙土地和连作的条件下，容易发病。根结线虫幼虫自根顶端侵入草落根组织，并在其中吸收根系养分。条件适宜时，根结线虫1年可发生数代。

3.防治方法

种苗处理和栽植的选择:草每定植前,除掉有病的植株,结合其他病害的防治,可用50%多菌灵可湿性fen剂加50%辛硫磷乳油800倍液浸洗草葛苗,待药液晾干后栽植。或者在栽植草范前,将休眠母株在45-50t热水中浸泡10分钟,可有效杀灭线虫。加强栽培管理,一旦发现病株.要及时清除.带出沮室后集中销毁;深翻改土,可将含病残体的土层深埋,以降低病害的传播基数。土壤管理.要求有机肥和无机肥合理搭配,发病重的地块应该进行2-3年轮作种线虫不危害的作物,如花生、大豆、芋头、胡萝卜等.生物防治。定植前用2%阿维菌素300。倍液浇灌穴,每穴0.1-0.25克,然后定植覆土;或使用线虫天敌(厚抱轮枝菌),在移栽时用4-6袋线虫必克与农家肥混施.物理防治。

江苏法兰地草莓苗-乾纳瑞农业-法兰地草莓苗多少钱由泰安市乾纳瑞农业科技有限公司提供。泰安市乾纳瑞农业科技有限公司(www.qiannarui.com)是从事“农业技术的研发;苗木种植、销售(不含种子);水果批发、零售”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:潘经理。