

乾纳瑞农业 京郊小白草莓苗价格 西藏京郊小白草莓苗

产品名称	乾纳瑞农业 京郊小白草莓苗价格 西藏京郊小白草莓苗
公司名称	泰安市乾纳瑞农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13505388845

产品详情

草莓根腐病害防治

根腐病：从下部叶开始，叶缘变成红褐色，逐渐向上凋萎，以至枯死。支柱在中间开始变成黑褐色而腐烂，根的中心柱呈红色。

防治对策：草莓移栽前用40%芦笋青fen剂600倍液，浇于畦面，然后覆土，整平移栽，以有效杀死土壤中的病菌，京郊小白草莓苗供应，降低田间菌源基数，减少传染机会。

黄萎病：该病是土壤病害，主要症状是幼叶畸形，叶变黄、叶表面粗糙无比。随后叶缘变褐色向内凋萎，直到枯死。

创造良好的环境条件提高草莓嫁接苗的成活率

大芽大砧嫁接，大芽大砧嫁接是近年来出现的一种新的山东草莓嫁接法，嫁接方法同插接，只是在砧木2片真叶1心、接穗2片子叶刚展开时嫁接。这种方法嫁接成活率高，克服了普通插接法由于葫芦幼茎空心，接时易裂开或接后西瓜易在葫芦茎内扎根的缺点。这种方法延长了砧木苗龄，使嫁接适期拉长。操作简便，工效高，嫁接成活率高。

大芽大砧嫁接法，砧木比接穗提早播种15~20天，即砧木具有2片真叶时再播接穗。接穗播后7~10天，当砧木2片真叶1心、接穗2片子叶刚展开时嫁接。山东草莓嫁接苗的管理，嫁接苗接口愈合的好坏、成活率的高低，以及能否发挥抗病增产的效果，除与砧穗亲和力、嫁接方法和技术熟练程度有关外，与嫁接后的环境条件及管理技术也有直接关系。因此，京郊小白草莓苗价格，嫁接后应精心管理，创造良好的环境条件，京郊小白草莓苗多少钱一棵，促进接口愈合，提高嫁接苗的成活率。

草莓苗根系分布浅，吸收水肥能力较差，而且地上新茎叶簇生，蒸腾作用强。因此，随着生长量加大，需要加强水肥管理，小水勤浇，根际和根外追肥兼施，才能使植株健壮，增强抗逆性。下面来看一下草莓苗该如何正确进行肥水管理吧。

草莓苗定植前，沼肥每亩沟施5500公斤作基肥;定植成活后1周，每亩用1：1(沼液：净水)沼液5000公斤停止进行一次根际追肥，半月后再按上述办法停止第2次根际追肥;在草莓着花结果期，每亩用1：2沼液45公斤停止叶面追肥，每10天1次，合计4次。南方蒔植草莓，做好越冬御寒步伐异常紧张。御寒步伐做欠好，轻易招致冻害的产生，重大时可以或许构成植株灭亡，从而影响经济效益。

草莓苗病虫害期间要补充叶面肥和微量元素，可喷志信花果宝、螯合锌、螯合铁等微量元素以加快花芽的进一步分化。温馨提示：加入的微量元素要是螯合态，并且要溶化完全后喷施，还要注意硼肥不可以叶面施用。10月1日第五次施肥。海藻鱼蛋白、每亩斤钾。这一时期一波花芽分化已经完全，根系生长占其总生长量的80%以上，为扩大根冠和促进须根生长。

草莓种苗的肥水管理应该遵循“少量多次”的原则，保证肥水供应平缓充足。避免大起大落，西藏京郊小白草莓苗，形成波动，影响其正常生长。对于基质育苗，每天滴灌5~6次，每次以水渗出基质为宜；对于土壤育苗，应当根据土壤性质进行浇灌，保持土壤湿润。注意经常检查滴灌带，防止出水口堵塞造成灌shui不均。

乾纳瑞农业-京郊小白草莓苗价格-西藏京郊小白草莓苗由泰安市乾纳瑞农业科技有限公司提供。泰安市乾纳瑞农业科技有限公司（www.qiannarui.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！