

# 脆红李子树苗 脆红李子树苗报价及价格

产品名称	脆红李子树苗 脆红李子树苗报价及价格
公司名称	泰安开发区利群苗圃
价格	3.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13561766718

## 产品详情

李子苗科学种植技术：李子是一种分布范围很广的温带水果，因其生存力强的特性，所以在我国大部分地区都有栽种。因其产量很高，所以每年到了李子成熟的季节，市面上会随处可以看到它的身影，其食用性和性都非常强。

疏花疏果。 原则。李结实性强，通过整形修剪、疏果等措施调控产量，原则上每亩控制在1000千克-2000千克之间。

幼龄李园（挂果前）施肥技术。建园第一年在5月1日前以施清水或清粪水为主，5月后至8月每半个月施一次含2%尿素的清粪水（50千克清粪水+0.1千克尿素），9月株施3.5千克-5千克腐熟的农家肥；第二年3月-8月每半个月施一次含3%尿素的清粪水（50千克清粪水+0.15千克尿素），9月株施7.5千克-10千克腐熟的农家肥。注：1千克是2斤。食心虫：为害李子果实的食心虫种类较多，主要在李树落花挂果期间即发生为害。防治方法：

修剪： 幼年树。定植三年内的幼树重点是培养主侧枝，调整角度，抑强扶弱，平衡树势。以夏季修剪为主，多采用拉枝、抹芽、摘心等修剪方法。冬季修剪适当短截延长枝，迅速形成骨架和扩大树冠；疏除内堂枝、密生枝和位置不当的枝。 结果树。根据品种特性。树龄、产量等确定结果母枝的剪留强度和更新方式。逐渐加重短截，调节生殖与营养生长的平衡。疏除内堂枝、密生细弱枝和病虫枯枝，使枝梢分布均匀、互不遮荫、树体通风透光。适时更新修剪，防止结果部位外移和大小年结果。结合夏剪，以冬剪为主。 衰老树。重回缩骨干枝至5年左右位置，潜伏芽抽生萌条，培养成新的树冠。同时，对衰老树中下部长出的徒长枝进行拉枝或适当短截，促发分枝，形成结果枝，以填充树冠，恢复树势和结果能力，延迟结果年限。

病虫害防治：李树的虫害主要有蚜虫、桃蛀螟、桑白蚧、红蜘蛛、桃小食心虫，以及红菌性穿孔病(枝干严重流胶)、红点病，生产上主要应搞好常规防治，如通过冬季清园，剪除、搜集病虫枯死枝，并集中烧毁。春季萌芽前(安徽中部在3月中旬，南北方要相应提前或推迟)熬好、打好石硫合剂(见附录)。做到做好这些，就等于做了全年病虫害防治工作的1/4。在此基础上，有条件的地方要搞好病虫害测报、预报。蚜虫发生时可用吡虫啉(即一遍净，蚜虫灵)进行防治。红蜘蛛、桑白蚧等可参照安农1号管理技术中病虫害防治部分相应技术。李树细菌性穿孔病应属重点病害，生产上应列为防治重点，其方法为： 增施有机肥，尤其是土杂肥，改良土壤，增强树体抗病能力； 生病时先用农用链霉素(使用倍数见说明书)喷雾。发

生流胶时可用石硫合剂残渣或用石硫合剂原药兑水2-3倍后用硬毛刷蘸药水涂刷伤口。如在石硫合剂中加入少量生石灰形成石灰浆，则涂刷效果更好。其它可参照桃树相关病虫害防治。