

大棚草莓苗什么品种好 大棚草莓苗新品种

产品名称	大棚草莓苗什么品种好 大棚草莓苗新品种
公司名称	泰安丰兴农业科技有限公司
价格	.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安高新区北集坡办事处季家庄
联系电话	0538-8911293 18554190888

产品详情

1、应时扣棚保温。

通俗当气温降至5℃以下时，就应及时在草莓栽培畦上扣上半圆形小拱棚，上覆无色塑料薄膜。扣棚初期要寄望通风，避免棚内超越30℃，特别是好天无云、日光强的正午前后，更应避免高温灼苗。别的，当棚内最低气温在5℃上下时，夜晚应在棚膜上袒护纸被或草苫保温，日间日出后及时揭去，以增加日光晖映，提高棚内温度，谨防冻害或沤根。进入数九寒天，棚内最高温度若处于10℃以下时，日间也不要揭去袒护的保温资料，以利草莓安然越冬。“五九”、“六九”天此后，外界气温摆荡在0℃以上时，可以在日间日出后揭去纸被或草苫，但在傍晚日落前要及时盖上，以对峙拱棚内有较高的温度。当小拱棚内温度夜间也摆荡对峙在5℃以上时，便可除去袒护物，并随时寄望气候变卦，及时通风避免高温毁伤。

2、防早蕾早花。

大棚草莓分娩过程中，随便产生植株早现蕾、早开花现象。这类现象产生过量，会严重影响草莓的产量和质量。大棚草莓产生早蕾、早花现象与以下成分有关。一是与种类特点有关。花芽随便分化、休眠较浅的种类，如丽红、秋喷喷鼻等，休眠工夫仅需50小时旁边，休眠期所需高温量较少，随便呈现早蕾现象。二是与肥料、假植影响惹起花芽过早分化有关。为避免草莓早蕾早花，分娩中应做到以下几点：一是选择适合的种类。大棚栽培应选择休眠较浅的种类。假定选择休眠性较强的种类，保温袒护不宜过早。二是育苗过程中，公道施肥，加强办理，培养壮苗。通之前老叶、去花序、理顺蒲伏茎、喷施赤霉素等编制，加强对母株的办理，分娩出优良壮苗。三是扣棚后寄望节制温度。对曾产生早蕾早花的植株，及时摘除花蕾，加强肥水办理，促进腋芽开花结果，增加损掉落。

3、加强肥水办理。

大棚草莓结果期长，要在重施基肥的根基上公道追肥，以满足其营养恳求。追肥采纳“大批多次”的绳尺，从扣棚至现蕾，可10天旁边施肥浅水一次，每次每亩施尿素10公斤，过磷酸钙和氯化钾各5-8公斤。别的，中前期可连络喷药，叶面喷多元微肥或植宝素等无机营养液，以提高草莓果重和含糖量。大棚内

气温太高，泥土水分蒸发量大，应及时灌水。前期外界气温高，灌水在傍晚遏制；前期大棚表里气温均较低，灌水在上午遏制。灌水后前辈步棚温，然后加大放风量，降落湿度。浇水不克不及过勤，每首要灌透。开花前1周中断浇水，开花后15天连络施肥浇一次水。

4、防畸形果。

在主栽种类中混栽一些花粉量多的种类，是预防大棚草莓畸形果的有效编制。本地主栽种类为宝交早生，授粉种类为春喷喷鼻、丰喷喷鼻等，通俗配栽5%-10%。草莓开花期不克不及喷施农药，避免花粉抽芽率降落，影响受精，产生畸形果。可以在草莓开花前用药防治病害，开花后及时肃除病株，摘除病发叶片和花序，节制病害伸展。墒情贫乏时及时遏制垄间地膜暗灌。缺肥时连络浇水每亩施45%三元复合肥15公斤，不要施用碳酸氢铵。肥料用水稀释后打孔追施成果更好，多么能以水促肥，满足草莓正常开花结果的需要。

5、防治病虫害。

应用小拱棚栽培草莓，因为棚内小状况内温度高、湿度大，极易产生白粉病、灰霉病等病害及地下益虫毁伤草莓株。关于虫害可在定植前用25%辛硫磷对水或掺细土撒在泥土中，或用敌百虫粉撒在土中防治。关于病害，应在覆膜后，及时喷洒40%甲基托布津300-400倍液或240倍的波尔多液。

泰安丰兴农业科技有限公司承诺：所售苗木均保证品种纯正、无病毒病害、保证移栽成活率！详情请致电咨询！