

梨树苗新品种 1公分早酥红梨树苗 山东梨树苗基地

产品名称	梨树苗新品种 1公分早酥红梨树苗 山东梨树苗基地
公司名称	泰安高新区丰田园艺场
价格	3.00/株
规格参数	丰田园艺:丰田园艺 成苗:成苗 山东:山东
公司地址	泰安市高新区一天门大街
联系电话	13561785584

产品详情

泰安开发区丰田苗圃，行业专注领域二十余年，十年如一日.一心只为客户创造更多价值，本苗圃支持政府定向扶贫一站式采购，网商规模批发分销，驰骋行业领域二十余年，我们有能力服务合伙人。本苗圃是集引种、繁育、实验、、服务为一体化的大型果树，绿化苗木基地，占地900余亩，下设三个基地。山东果树所、农科院及有关从事果树研究的专家的协助下，每年繁育及销售全国各地上千万的优质果苗。我们的宗旨是：诚信至上，只为客户创造更多价值。

苏翠一号由江苏省农科院园艺研究所以华酥×翠冠于2003年杂交选育而成，为优质早熟大果型梨品种。三年生平均亩产130公斤，四年生平均亩产400公斤，早果，丰产性好。树枝较开张，叶片长椭圆形，每花序花5-7朵花，花粉量多，果实卵圆形，平均果重260克。果面平滑，腊质多，果皮黄绿色，果锈极少或无，果点小疏。梗洼中等深度。果心小，果肉白色，肉质细腻，石细胞极少或无，汁液多，味甜。果实生育期105天，南京地区7月上中旬成熟。易于成花，应加强肥水管理，花后及果实膨大期可追2次肥，秋后施足基肥。合理负载。及时疏果，以留单果为主，以防树势早衰。疏果后宜套袋栽培。易感褐斑病，生产中应加强果园排水，改善树体通风透光，采后及时喷杀菌剂，加强病害防治。

黄金梨，梨的一个品种，落叶乔木。果实扁圆形，平均单果重350克，9月上旬成熟。成熟时果皮黄绿色，储藏后变为金黄色。果皮洁净，套袋时果皮成金黄色，呈透明状。果肉细嫩而多汁，白色，石细胞少，果心很小。含糖量可达14.7%度。味清甜，而俱香气。风味独特，品质佳。易成花一般栽后次年成花可见果。丰产。梨即“百果之宗”。黄金梨是梨的一种。因其鲜嫩多汁，酸甜适口，所以又有“天然矿泉水”之称。果实艺状：果实近圆形或稍扁，平均单果重250克，大果重500克。不套袋果果皮黄绿色，贮藏后变为金黄色。套袋果果皮淡黄色，果面洁净，果点小而稀。果肉白色，肉质脆嫩，多汁，石细胞少，果心小，可食率达95%以上，不套袋果可溶性固形物含量14%~16%，套袋果12%~15%，风味甜。果实9月中下旬成熟，果实发育期129天左右。较耐贮藏。栽培在有机质含量高的沙质土壤上，并要土层深厚，透气良好，浇水条件好

对较粗的主枝可采用插接的方法。对砧木先用刀削一下，露出形成层，用竹签先插一下，以利于接穗的插入，然后把接穗削成马蹄形，把马蹄形背面的外皮削去三分之二，把削好的接穗插入砧木即可，外面用泥土封严，再用塑料薄膜封严。在每个主枝上插接三个接穗。这样就算接好了。对偏冠的梨树，可采用腹接的方法在缺枝的方向，先在主枝的树皮上削一个三角形口，用竹签先插一下，然后把接穗削成马蹄形，把马蹄形背面的外皮去掉，把削好的接穗插入树皮即可。外面用泥土封严，再用塑料薄膜封严。这样就算接好了。

新梨7号生长速度快，4月份开花，6月中旬就可以觅食，自然采收期长，可从7月中旬到8月底，与中暑品种相同，感大特点是特别酥、皮很薄，吃起来感很像香酥梨，特别爽，丰产性很强，大部分以短果枝结果，单果重一般达180克左右，大果可达到200克。

黄金梨采收时气温、库温均较高，如利用自然降温的贮藏库（窖），黄金梨不可直接入库，而要充分预冷以迅速散去田间热。因此，要尽量利用低温进行预冷，注意防止日晒和雨淋。研究表明，黄金梨果实能够适应采后的快速预冷。因此，果实采后可直接放入低温冷库预冷。梨树在春季是先展叶，后开花。但与苹果不同的是在同一花序内边花比中心花先开，而且结果也较好。梨树的长梢多为春、夏梢组成，很少有秋梢。春夏梢上的芽都很充实，萌发率也很高，只是春梢上的芽夹角较大，夏梢上的芽夹角较小，这些特艺在修剪时应注意利用。新梢上的叶片在幼嫩时无光泽，当面积长到仁大停止生长后才呈现出油亮发光，此时称为亮叶期。亮叶期表明全年85%的叶量已经形成，树体的营养由消耗转向积累，中、短枝顶芽开始花芽分化。

梨树除特殊情况外，一般很少发生二次枝。枝条的顶端优势和垂直优势很强，同一母枝上的单枝间生长差异较大。直上的枝短截后，由上向下发枝越来越短，很少有竞争枝，若不剪截进行缓放时顶芽是单条延伸，很少发生分枝。弯曲的平、斜枝多在弯曲的高处发长枝，在顶端和背上发较长枝，其他部位发中、短枝。梨树的枝条萌芽率高，成枝力弱，容易形成中短枝，特别是枝条在前期生长快，停长早，顶、侧芽都较饱满充实，利于成花结果。所以，梨树只要肥水充足和轻剪多放，就容易早果丰产。梨树有花粉直感现象，授粉品种不同会使果实的形状和品质发生变化。长、短枝之间分化明显，转化力弱。枝干下部的结果枝很易衰弱形成短果枝群，其枝龄超过6年后若不及时更新复壮，结果能力很快下降。结果枝在开花结果的同时，果台多能萌发副梢，当年成花，下年连续结果。果台副梢的多少和长短常因品种不同而异，多数品种易形成“鸡爪”式的短果枝群。梨树的落花落果有落花重、落果轻的特点，而且后期落果较少

梨成枝力弱，对发生的长枝要尽量利用，以扩大早期枝叶量，争取早期丰产。特别对发枝很少的一些日本梨及鸭梨等要少疏枝，对发生的强枝尽量设法利用，通过改变方向、位置、长势，使其成为有用的枝。如直立旺枝，可采取长放结果，结果后即开张下垂转弱，再回缩利用。或强拉使平斜生长。对主枝背上发生的旺枝，可通过夏季摘心、扭梢，加以利用。总之要使多发枝、少疏枝、多利用。尽早注意主枝中后部枝组的培养，多培养背斜侧大中枝组，控制主侧枝先端延伸速度，防止结果后下部空虚无枝。保留下来的长枝实行长放，使之转化结果。

梨树定植后第一年为缓苗期，往往发枝很少，亦很弱。这种情况不要急于确定主枝，冬季可不修剪

，或者对所发的弱枝，去顶芽留放，并在主干上方位好的部位，选壮短枝，在短枝上方目伤，使其第二年发枝，这种短枝所发的枝，基角好，生长发育好。对留下的弱枝，仅去掉顶芽，可使主枝间平衡，然后按强枝重截、弱枝轻截的办法平衡留用主枝之间的生长势。当一年选不出三个主枝时，则对留下的主枝，要略偏重短截。对于辅养枝，应多留长放，撑拉开角，增加枝叶，使早成形早结果。过于强旺枝条先拉平利用，当影响到骨干枝生长时，用缩、截、疏的方法为骨干枝让路