

矮麦冬草 陕西麦冬草 圣茂麦冬草种植基地

产品名称	矮麦冬草 陕西麦冬草 圣茂麦冬草种植基地
公司名称	襄阳市襄阳经开区圣茂麦冬种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄阳经开区东津镇一社村七组
联系电话	15072222251

产品详情

田间管理

- 1、间作。麦冬需要阴湿的环境，主产区都实行间作。
- 2、中耕除草。栽苗半个月左右，应除草1次，并松土深约3厘米。5-10月杂草生长旺盛，麦冬草报价，每月须选晴天除草并浅松表土1次。
- 3、施肥。。第1次在7月，每亩施人畜粪水1200公斤，加腐熟菜饼25公斤。第2次在8月上、中旬，每亩施人畜粪水1500-2000公斤，加腐熟菜饼40-50公斤，火灰75公斤。第3次在11月上旬，每亩施人畜粪水1500-2000公斤，加菜饼25公斤，火灰75公斤或过磷酸钙20-25公斤，第4次在栽种后的第2年2月下旬，每亩施猪粪水2000-2500公斤，加尿素5公斤，金边麦冬草，过磷酸钙7公斤。
- 4、灌溉。立夏后天气渐热，水分蒸发量大，应及时浇水。冬春发生干旱，要在立春前后浇水1-2次，促进块根生长。夏季雨水集中，应及时排除田中积水，防止高温多湿发生病虫害，影响生产。

黑粉病在世界各地均有分布，矮麦冬草，病源为黑粉菌，是一种高度寄生专化性的病原物，可以在麦冬草的叶片、叶鞘、茎以及花序等部位引起特异性症状。麦冬草黑粉病的防治还需从种植抗病草种开始，更新或混合种植改良型草地早熟禾能有效控制病害。在麦冬草叶黑粉病发病初期，可用粉锈宁等药剂喷雾。喷克菌、阿米西达、醚菌酯等对真菌性病害有好的效果。

麦冬，棵型总高度0.5~2米高上下，树叶形态根据品种不同有区别，有些很细很长，有些较圆，麦冬花蕾颜色是充实，如大红色，粉色，深黄色，白色等，开花时间十分长，花量大，每年是开花的时间从6月中旬到9月初，果实9~10月才熟，有较高的出芽水平。广泛散布在亚洲，欧洲地方，中国江苏沭阳，吉林，陕西麦冬草，廊坊，江苏，陕西等全是麦冬的重要产地。

麦冬特别喜欢日照充足的环境，也略耐荫，耐寒，耐旱，喜暖和雨露充沛的气候和富含有机质的土壤。萌蘖力与萌芽水平都很强，耐修剪。长在小河岸边、路边、空旷地和山沟中，海拔2981300米。

麦冬每年撒施两次，1次是底肥，在隆冬或初春追施猪粪；另1次在谢花之后的生长期，撒施化肥，以化肥为主要。

矮麦冬草-陕西麦冬草-圣茂麦冬草种植基地(查看)由襄阳市襄阳经开区圣茂麦冬种植专业合作社提供。襄阳市襄阳经开区圣茂麦冬种植专业合作社（www.xymdcpf.com）是湖北襄樊,花木的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在圣茂麦冬草种植基地领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创圣茂麦冬草种植基地更加美好的未来。