

# 大棚葡萄苗批发货源充足 鲁粒大棚葡萄苗

产品名称	大棚葡萄苗批发货源充足 鲁粒大棚葡萄苗
公司名称	寿光市鲁粒葡萄种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市上口镇东方吕村
联系电话	13465730661

## 产品详情

### 病症

#### 瘤蚜病

葡萄苗生长的过程会出现很多问题，如：葡萄根部长了类似骨头似地结，而且还在结上纵向的裂开了。这就是一个葡萄根病，这个病是发生在葡萄的根、根颈和老蔓上。瘤的大小不一，有的数十个瘤簇生成大瘤。老熟病瘤表面龟裂，在阴雨潮湿天气易腐烂脱落，并有腥臭味。受害植株由于皮层及输导组织被破坏，树势衰弱、植株生长不良，叶片小而黄，果穗小而散，果粒不整齐，成熟也不一致。病株抽枝少，长势弱，严重时植株干枯死亡。

解决办法：可先将瘤切除，然后抹石硫合剂渣液等药液，也可用50倍菌毒清或100倍硫酸铜消毒后再涂波尔多液。对此病均有较好的效果，加强栽培管理，多施有机肥料，适当施用酸性肥料，改良碱性土壤，使之不利于病菌生长。农事操作时防止伤根。田间灌溉时合理安排病区和无病区的排浇水的流向，以防病菌传播。葡萄苗木的根瘤蚜主要危害根部。根部被害后，生出瘤状物。初为鲜黄色，以后渐变为褐色而腐烂，使地上植株叶子变黄，果实变小，树势衰弱，产量质量明显下长，严重时全株枯死。虫体身体柔软，外表很像蚜虫，但腹部没有腹管。

寿光市鲁粒大棚葡萄苗木繁育基地欢迎新老客户来电咨询！

#### 葡萄扇叶病

葡萄扇叶病（Fanleaf）由葡萄扇叶病毒(Grapevine fanleaf virus, GFLV)侵染所致。春季症状明显，主要表现为叶片不对称，叶缘锯齿加深，叶柄凹大宽张，主脉异常聚近，呈扇状，有时伴有褪绿斑驳；枝条扁平化，分枝不正常，双芽，拐节，节间缩短；叶片常出现黄色斑点（有时为环斑或线纹斑），后期发展为黄绿相间花叶，直至整叶变黄，黄化叶片逐渐变白，最后脱落。其它线虫传多面体病毒侵染葡萄也会引起扇叶病症状，但在田间无法区分，只能通过实验鉴定才能明确。欧洲一些国家对比研究表明，受葡萄

扇叶病毒侵染的葡萄，生根率可降低60%，枝条产出率减少46%，嫁接成活率降低30%~50%，产量损失达30%~80%。

寿光市鲁粒大棚葡萄苗木繁育基地欢迎新老客户来电咨询！

## 夏天培育葡萄苗的方法

葡萄于夏季扦插育苗，可在当年秋季出圃，是缩短育苗周期的有效办法。它具有占苗地时间短、成活率高、减少冬季贮存工序和投资、苗木质量好、生长旺等优点。

### 一、扦插时间

6-8月，当年生新蔓已经生长至5-10节，即7月中旬（小暑到大暑），是扦插的好时机。

### 二、插床准备

苗床要求光照好，排灌方便，土壤疏松肥沃，苗地翻耕整平，筑成1.0-1.2宽的插床（预计插3-4行，株距6-8厘米）待用。同时备好支架和树枝等，供遮阴用。为提高夏插成活率，扦插前可用生根粉等进行处理。

### 三、扦插操作

插穗应选已木质化、芽呈黄褐色的春蔓，剪成20-25厘米长（有3-5节）的小段，插穗顶端留1叶，其它叶连同叶柄一并剪掉，下端从芽节外斜剪成马耳形，插穗剪好后及时插入苗床，为了避免插条失水，应随采随插；扦插后将土踩实，大棚葡萄苗批发，灌透水并搭好荫棚。荫棚高0.8-1.0米，棚宽与畦宽相同。遮阴度为60-70%。插后应保持床土潮湿而不渍水。插后15-20天，插穗萌芽，抽生新蔓便可逐渐拆除荫棚。在新芽萌发后，少量多次追肥，以保证当年秋季出圃优质苗。

寿光市鲁粒大棚葡萄苗木繁育基地欢迎新老客户来电咨询！

大棚葡萄苗批发货源充足-鲁粒大棚葡萄苗由寿光市鲁粒葡萄种植有限公司提供。寿光市鲁粒葡萄种植有限公司（[www.dapengputaomiao.com](http://www.dapengputaomiao.com)）为客户提供“大棚葡萄苗木,大棚葡萄苗,果树苗木,核桃苗,桃树苗,梨树苗”等业务，公司拥有“鲁粒”等品牌。专注于花木、果木种苗等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。