

金枫绿化 美国红枫批发价格 美国红枫

产品名称	金枫绿化 美国红枫批发价格 美国红枫
公司名称	泰安金枫园林绿化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安肥城市孙伯镇
联系电话	15066724999 15066724999

产品详情

美国红枫的扦插步骤

美国红枫是硬枝扦插很难生根的树种，常用夏季嫩枝扦插。因美国红枫嫩枝抗逆性差，扦插时正值夏季，气温高、水分和养分消耗大，易引起枝条枯萎si亡。下面谈谈美国红枫扦插步骤：

- (1) 对温室进行杀菌消毒；
- (2) 将泥炭与珍珠岩混合并充分拌匀，用高meng酸jia杀菌消毒后，装入穴苗盘，墩实，摆放入温室，美国红枫，并浇透水；
- (3) 美国红枫穗条选择当年生半木质化、生长健壮、无病虫害的枝条，剪取时要分段，并留芽留叶；
- (4) 剪好的美国红枫插穗消毒后根据不同的剪取部位蘸不同的生根剂后，进行扦插；
- (5) 扦插后对红枫扦插苗进行温湿度控制，肥水管理。该方法不受地域和气候条件的限制，操作简单，繁育快，生根率可达95%以上，可大面积繁殖无性苗，培育出的红枫小苗可保持母本的优良性状，最为盆栽、小盆景适用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安金枫园林绿化有限公司

美国红枫的扦插条件及扦插技术

美国红枫的扦插条件1. 扦插基质要求苗床土排水良好，持水力较强，通气性好、升温快，保温性强，无病虫害隐患。常用的有下列几种：河沙以不含有有机质的中等粒度的石英沙为zui好，普通沙子也可，它具有通气、排水良好，易吸热增温和一定的持水能力。蛭石和珍珠岩是近几年来采用的一种新基质，具有质地疏松、透气性好、保水保温力强等优点，适宜各种花卉扦插或播小粒种子育苗用。此外，腐熟的木屑、木炭粉、谷壳灰等也可作扦插基质。各类扦插基质在使用前均应进行消毒，如用高温锅蒸、锅炒或用水1000倍的高meng酸钾溶液对插床喷洒，以防止病早危害。消除病虫害是提高插穗成活率的重要因素之一。基质铺设度依插穗长短而定，一般是与插穗长度相同或多1/4。不可过厚，否则渗水、透气性差，对生根不利。2. 扦插环境温度一般花卉插穗生根所需土壤湿度以20 - 28 ° C为宜，土温的高低对插穗能否成活影响甚大，土温高于气温3 - 6 ° C对成活更有利。空气湿度光枝插穗由于水分蒸腾量小，空气温度可略微低些，但相对湿度不能低于60%；带叶扦插的插穗，要求较高的空气温度，相对湿度一般应保持在80 - 90%。过于干燥，水分供不应求，会赞成扦插失败。

美国红枫扦插技术

1. 插条选择应选择美国红枫品种的母株长势旺盛、枝叶粗壮、生长充实、时间短、腋芽饱满、无病虫害的新生枝条作为插穗，以利成活。不带叶的插穗扦插后，生根发芽所需要的养料，都依赖于插穗本身来供给，因此，插穗一定要成熟、粗壮、养料充足。带叶的半成熟插穗生根所需要的养料，则领带扦插后插穗所带叶片的光合作用临时制造，美国红枫树苗基地，所以叶片的多少、大小和质量对生根快慢影响甚大。因此，选择插穗时，要在可能的范围内昼保留较多的叶片。就一株母体而言，中上部的枝条较好，一根枝条则以中部为好，而一、二年生枝条又比多年生枝条好。

2. 枝条剪取剪取插穗时，下端应从美国红枫树叶的di一个叶柄下方半厘米的地方平剪或斜剪下来，这个部位形成层比较活跃，养分积累多，易于生根。上端应保留2 - 4个芽，从高于芽项0.5 - 1.5厘米处平剪。

3. 插穗处理插穗剪取后，要立即扦插，尤其叶插更应及时，以防萎焉；插穗剪后可在通风处晾一段时间，待剪口干缩后再扦插，以免腐烂；

美国红枫的扦插时期以生长期扦插为主，休眠扦插为辅。

1. 生长期扦插也叫带叶插，只要条件具备（如在温室条件下），一年四季均可扦插繁殖，自然湿度条件下扦插的最适时期为6 - 9月份，这一时期，多数木本花卉经春季di一次生长终了，插穗含养分较多，有利成活。

2. 休眠期扦插也叫光枝插，通常秋季落叶后采条，经理藏越冬，第二年春季3 - 4月份再进行扦。

美国红枫插后管理在扦插盆上或苗床上罩以塑料薄膜或政，美国红枫生产厂家，以保持一定的湿度和温度。为避免日光暴晒，引起水分大量蒸腾而导致叶片萎焉，影响成活，要注意遮阴，把扦插盆放在阴蔽处。水份管理，美国红枫批发价格，应根据天气情况，适时喷水，保持适宜的空气温度。喷水不易过多，以免基质湿度过大，影响生根。插穗生根后，再停半月左右，就可移出栽入盆中，先放在荫蔽处缓苗，待根系发育良好，植株健壮后，再逐步移到阳光充足之处，按常规进行管理。

黑螨害（俗称红蜘蛛）

1、病因：黑螨是一种常见的病虫害，当数量达到一定规模时候，使树木树叶早落，影响变色。黑螨害是影响红枫不变色的重要原因之一。

2、表现：4月份中旬，卵孵化，在内膛叶片上，6月份之后，从内膛向外围扩散，麦收前后，为大量危害（猖獗发生期）。麦收后（七月底-八月初）为后期，八月份之后逐渐减少，一般防治到八月中旬就结束了。一般性的危害，最晚九月初产生红色越冬卵，如果危害严重时，八月份就会产生越冬卵，越冬卵一般产在树干上，枝条的芽旁，轮痕处，虫卵为红点，严重时有时会成片。园区易发生，在自然条件下，树木间距大于冠幅2倍，自然种植2-3年，危害可逐渐减弱并消失。

金枫绿化(图)-美国红枫批发价格-美国红枫由泰安金枫园林绿化有限公司提供。泰安金枫园林绿化有限公司（www.jinfenglvhua.com）在花木、果木种苗这一领域倾注了无限的热忱和热情，金枫绿化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.hyntzjg.com）还是从事火焰南天竹扦插苗价格，火焰南天竹基地，火焰南天竹供货商的厂家，欢迎来电咨询。