

美国红枫生产厂家 金枫绿化 美国红枫

产品名称	美国红枫生产厂家 金枫绿化 美国红枫
公司名称	泰安金枫园林绿化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安肥城市孙伯镇
联系电话	15066724999 15066724999

产品详情

秋季栽植苗木成活率一定高吗？

秋后，气温逐渐降低，树木根系迎来生长高峰期，故此也成为园林绿化工程施工的黄金季节。但在日常工作中，我们常发现一些园林工程中秋季栽植树木的成活率并不高。那么秋季应怎样栽植苗木呢？

1、时间不宜早

栽植树木较好的前提条件：一是气温较低；二是树叶大量脱落。

因为只有气温低了，树木的蒸腾量才能减少。树木根系在受损后，吸收水分的能力不强，如果此时气温高，势必会造成蒸腾量大于吸收量，形成水分吸收和蒸腾不平衡，从而导致树木si亡。此外，树木落叶后，水分蒸腾量减少，利于树木成活。

但在工作中，一些施工人员为了加速工期，提前栽植树木，虽然采取了加大土球等措施，但仍不能保证成活率。故此，苗木栽植zui好选择在11月初后进行，一般在上冻前均可，对于一些落叶较早的树木，美国红枫，如青桐、国槐、法桐等乔木，也可在10月下旬进行栽植。

2、浇水不宜少

有的人在栽植工作中，忽视了浇水工作，仅仅在栽植后浇一水就不再浇水了。其实，秋季栽植树木，浇水工作仍然很重要。

秋季过后是漫长的冬季，气温虽然不高，但持续长时间的冬季风，也会带走树体内的水分，这就是很多树木在冬季发生抽条的原因所在。所以，秋季栽植浇水至关重要，应该根据栽植时间的早晚来确定浇水次数。

10月下旬栽植的树木，应该浇三水，即栽植后马上浇头水，10天后浇二水，再过15天后浇三水。

11月上中旬种植的树木，最少浇两水，即栽植后立即浇头水，再过15天浇二水。

12月初或是上冻前栽植的树木，则只浇一水，即栽植后浇的头水。

总之，浇水必须要浇足浇透，水宁大勿小。

3、栽植不宜浅

关于种树的谚语说得好：“春宜浅，秋宜深，谁反着种谁丢脸。”这句老话说明一个问题，那就是秋季栽植树木时，深度应该略比春季栽植的树木深一些。

其原因在于冬季气温较低，如果栽植过浅，极易造成树木根系冻害。另外，秋季树木深栽也利于新根的喷发。其栽植深度应该高于树木根茎部原土痕的5厘米至8厘米，翌年春季结合浇冻水，可将表土拨开，这样做既利于树木在冬季喷发新根，保证成活率，也利于树木在春季抽生新芽。

4、肥料不宜缺

很多人认为，秋、冬两季树木不生长，此时施肥是浪费。其实，优质绿化苗木美国红枫，这个观点是错误的。秋季栽植树木，适当施肥是很有必要的。

此时施肥，有两个作用，一是可以有效提高地温，利于喷发新根，二是能给新根提供充足的营养，利于春季发芽长枝。

5、修剪切记不马虎

修剪不能省，一些人在秋季栽植树木时，往往忽视了树木的修剪工作，认为秋冬树木蒸腾量较低，不修剪树木也一样能成活。其实，秋冬季蒸腾量虽然低一些，但适当修剪，对提高树木的成活率也是很有好处的，故此栽植前的修剪是不能省的。

在修剪时，要根据树木的生态习性和观赏需求来进行，疏剪和短截相结合，在保证树木成活的前提下，zui大限度地保留枝条，以利于观赏。对于较大的伤口应该采取伤口抹愈合剂来进行保护。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安金枫园林绿化有限公司

对行道树多一些人文关心

城市道路两边的行道树不仅是一道靓丽的风景线，更是陪伴我们每天出行的勤务员。炎炎夏日，大家都喜欢躲在行道树的绿荫下享受清凉。蒙蒙细雨，行道树也能为行人提供一片遮挡。但来来往往的人群却很少关注行道树的健康，甚至忽略了一些树木被铁丝一绑就是数年，最后铁丝竟深深嵌进树身里。俗话说“人要脸树要皮”，树主要靠导管和筛管输送营养，筛管在韧皮部，也就是树皮；导管在木质部，活

的导管都靠近树皮，没了皮就活不下去。所以看似不起眼的一根铁丝，只要勒断了一圈树皮，就等于给树判了死刑。

人爱护树，体现了城市居民与绿色自然的和谐相处，彰显了绿色的人文关怀。当前全市的创卫工作正在如火如荼地开展，需要我们守护好城市的这笔“绿色财富”。首先，城市园林绿化部门应肩负起自身职责，对城市主干道的行道树定期进行养护管理；还应多关注天气气候变化和虫害变化，提前采取保温、防虫等措施。社区应做好背街小巷树木的养护管理，尤其对一些树龄较大，美国红枫哪里有，带有民俗典故和文化传说的树木应专门登记上报，做好保护。作为普通市民也应当对树木多一些人文关怀，不妨在日常出行散步时多抬头留意一下周围的行道树，及时制止教育一些顽皮孩童剥树皮的行为，对诸如被铁丝捆绑、生病严重的树木，可及时反映给园林绿化部门进行处理。

苗木种植生产广泛应用于森林物种、园林绿化、水果栽培、盆栽美化等领域。苗木夏季管理养护的好坏，直接影响到苗木的产量和质量，夏季是苗木一年中生长的di一个高峰期，但也是旱涝、病虫害多发季。此时应加大苗木管理养护力度。

苗木夏季管理养护技术主要包括以下八点：

1、遮阴

夏季气温高，阳光强度大，对于耐荫树种和花卉及播种期过迟的苗木要适当遮阴，在生长初期要采用降温措施，减轻高温热害的不利影响，如搭荫棚等，有条件的可采用遮阳网，保护苗木安全过夏，避免日灼危害。

2、防旱

炎热夏季，无论南北都会遇到干旱天气，这要及时进行灌溉。苗木速生期的灌溉要采取多量少次的方法，每次要浇透浇匀，且尽量避免中午阳光最强烈时候浇水(特别是小苗、新栽苗及地被等植物)。

3、防涝

夏季亦是阵雨多发期，尤其是多雨、多台风的南方，雨前、雨后应及时做好清沟排水工作。做床的地块如果比较低洼，在雨季到来之前，应提前挖好排水沟渠，及时排水。在夏季干旱的情况下，灌溉是培育壮苗的重要措施，天气干旱时要注意淋水，保证苗床湿润。(具体苗木雨季防涝措施可参考苗木花卉受涝怎么办，如何将损害降低!)

4、除草

夏季阳光好，雨水充足，也是田间杂草生长的旺盛期。杂草容易吸收土壤间的养分，影响苗木生长，所以必须做好杂草的清理计划，应尽量做到“除早、除小、除了”的原则。并结合使用一些chu草剂，来达到控制田间杂草的目的，对于苗木中的禾本科杂草，可以使用尖叶净防除，对苗木安全。

5、夏剪

无论什么苗木都需要修剪，使其更好的生长，夏剪相对于冬剪来说工作量就较小了，主要做好苗木的抹

芽、过密枝的疏剪及分蘖枝的清除工作。如果此时苗滋苔不能及时对苗木采取进行修剪措施，不仅造成了苗木的营养消耗，而且加大了冬剪的工作量，还影响了苗木的品质。

6、追肥

苗木生长需要提供充足的养分，为了满足苗木的旺盛生长需求，应及时地对苗木进行追肥，追肥以速效肥为主。尽量采取沟施、穴施的方法，以提高肥料的利用率。建议埋施微生物菌肥沃园或者有机无机肥乌龙珠。

7、防风

夏季天气风云莫测，大风天气极易给苗木造成大面积损害，美国红枫生产厂家，尤其是在台风多发地区，伴随暴风雨，所以应提前做好大树及新栽苗木防风工作，通过外力加固苗木的支撑，在苗木种植是注意适当密植，助于苗木根系生长，抓住更多的土壤，才不易被大风刮倒。

8、防zhi病虫害

随着苗木的旺盛生长，大量的食叶性害虫(如：刺蛾类、天蛾类、蚕蛾类，可以使用叶虫净每瓶兑水150公斤喷雾)、蛀干性害虫(如：天牛类、蠹蛾类，可以使用天牛一插灵)及地下害虫(主要是蛴螬，撒施地害平颗粒防治)等大量出现危害苗木。此时应加强田间调查，提前做好害虫预测，并及时地、合理地采取防治措施。

美国红枫生产厂家-金枫绿化(在线咨询)-美国红枫由泰安金枫园林绿化有限公司提供。泰安金枫园林绿化有限公司(www.jinfenglvhua.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的花木、果木种苗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金枫绿化和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.hywmjg.com)还是从事山东火焰卫矛价格，火焰卫矛工程绿化苗木，火焰卫矛供货商的厂家，欢迎来电咨询。