

北美冬青园 普吉园农业 北美冬青

产品名称	北美冬青园 普吉园农业 北美冬青
公司名称	南阳市普吉园农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐河县咎岗乡岗柳东500米路南
联系电话	15638980875

产品详情

果桑病病的防治

白果病，白果病是果桑的主要病害，它的主要来源是春天雨水较多，昼夜温差大，相对湿度较高，这时候最适合菌核生长，土壤中菌核通过日晒，抽出子囊盘和子囊孢子，孢子随风传播落浸桑椹，这时如不加强防治，将严重影响桑椹的品质和产量。所以这时候有必要采取综合措施，严格防治。现我们介绍几种较有效的防治方法；加强通过透光，在长势旺盛区块，适当摘掉部分桑叶，北美冬青，使果子得到一定的光照，提高自身抗病能力，也便于药防治。在发芽前期，在地面铺施有色地膜，防止地下孢子与果子接触，该办法在白果病重发区块特别有效。

剪枝后不

能立即施肥，因这时土壤中存有少量以前施下的肥料，北美冬青树，如剪枝后马上施肥，容易造成新枝拔节太快，而缺少木质硬度，此时如遇上大风一吹，很容易造成枝条倒伏，北美冬青园，然后满根枝条发芽出现菜花状，严重影响来年产量，施肥佳期可在枝条1米以上，活在8月中旬进行，施肥以有机肥为主，北美冬青盆景，同时可施氮磷钾三元素复合肥，用量每亩月20-25kg，但具体要根据当时桑树长势而定。

摘果后管理

摘完果子的桑树要立即剪枝。一年摘完果后的桑树要进行定杆，一般定杆要分二至三年进行，一年定杆可在离地面50-60cm处剪断，此时的桑树只有二杈左右（二年定杆可在摘完果后离地面80-1米处剪去）。以后可在此基础上进行剪枝，注意：剪枝后不要留叶子在树体上，要把所以叶枝全部剪完，每根剪去的枝杆等新芽长到20-30cm时进行梳枝，每根枝杆只留2-3根，第2至第3次定杆后，每株桑树多不超过8-10根枝条。

北美冬青园-普吉园农业(在线咨询)-北美冬青由南阳市普吉园农业科技有限公司提供。北美冬青园-普吉园农业(在线咨询)-北美冬青是南阳市普吉园农业科技有限公司（www.pujiyuan.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许忠全。