

波姬红无花果树苗，波姬红品种无花果苗批发

产品名称	波姬红无花果树苗，波姬红品种无花果苗批发
公司名称	泰安市广祥农业科技有限公司
价格	5.00/株
规格参数	粗度:1公分 高度:100公分
公司地址	山东泰安高新区北集坡镇
联系电话	0538-8912686 13954886187

产品详情

无花果的主要栽培技术包括建园定植、土肥水管理、修剪和幼树越冬保护等内容。1、建园和定植无花果栽培的纬度限制是北纬40°以南，冬季气温低于-15的地区不宜建园。建园宜选择背风向阳的地方，忌涝洼地。建园前深翻整地，亩施土杂肥2000—3000公斤。建园时应选良种壮苗，深坑浅栽，栽植时间以3月底至4月初为佳，胶东地区可延长4月中旬。栽植密度青皮无花果一般株距3—4米，行距4—5米；布兰瑞克无花果株距25—3米，行距4米。

土肥水管理土壤管理可参照一般果园进行。基肥可选用厩肥、土杂肥和复合肥。施用时间是早春和秋后。追肥种类，生长早期主要施用磷酸二铵，忌用碳酸氢铵和尿素；生长后期宜施磷酸二氢钾。相对来说，无花果较抗旱不耐涝，春季和越冬前注意灌水，生长季节应做好防涝排水工作。

修剪无花果树形培养适宜采用多主干自然开心形。栽植第一年定干，定干高度40—60厘米。第二年枝条留30—40厘米进行短截，增加分枝能力，控制树高，保留4—7个主枝。以后每年夏季对50厘米以上长枝进行摘心，控制旺长，或喷施矮化剂。同时疏除根蘖枝、过密枝和细弱枝。

幼树越冬保护栽植当年，无花果幼树抗寒能力差，枝条抽干较重，应采取保护措施。简便易行的方法是主干基部培土20—30厘米，枝条绑扎稻草绳。

红矮生无花果苗：植株较矮的，节间短的，红皮，黄肉，分枝力强。抗性强

紫色波尔多无花果苗：紫色波尔多是一种偏小的，紫黑色的无花果，适宜盆栽，果肉紫红色，最佳品尝无花果之一，风味俱佳，来自西班牙。叶片五深长细裂或无裂叶。叶片无托叶，叶底部钝角。类似加州黑，但比加州黑强壮，果比加州黑小紫。耐水湿和高温，不易裂果，不抗寒，北方需保护地栽培。

A42(华丽)无花果苗：1998年山东省林业科学研究完引自美国加利福尼亚州，观赏用品种。树势中庸，树姿较开张，一年生枝金黄色，少有绿色纵条纹。分枝力强，节间短，外形美。叶片中大，卵圆形，掌状半裂，基出叶脉5条，绿黄色。果实卵圆形，果颈短，果顶平坦，果目绿色，径2.8*3.6cm，果皮自现果至

成熟，呈黄绿两色条状相间，外形非常美观。果肉鲜红色，果实极耐贮运。该品种枝、果黄绿块状或条状相间，色形皆美。适应性强，较耐寒，易繁殖，第园林绿化，盆景制做的优良观赏型品种。

波姬红无花果苗：鲜食红色大型无花果优良品种。该品种树势开张，耐寒耐盐，始果部位低，极丰产。果实以秋果为主，果皮鲜红色或紫红色，果肉红色或浅红色，品质口感品质树势中庸、健壮，树姿开张，分枝力强，新梢年生长量可达2.5米，枝粗2.3厘米，节间长5.1厘米。叶片较大，多为掌状5裂，裂刻深而狭，叶径27厘米，基出脉5条，叶缘具有不规则波状锯齿。叶柄长15厘米，黄绿色。耐寒、耐盐碱性较强。始果部位2-3节，极丰产。果实夏秋果兼用，以秋果为主，果长卵圆或长圆锥形，果形指数1.37厘米，皮色鲜艳，条状褐红或紫红色。果肋较明显。果柄0.4-0.6厘米。果目开张径0.5厘米。秋果平均单果重60-90克，单果重110克。果肉微中空，浅红或红色，味甜，汁多，可溶性固形物含量16%-20%，为鲜食大型红色无花果优良品种。

金傲芬无花果苗：树势旺，枝条粗壮，分枝少，年生长量2.3-2.9米，树皮灰褐色，光滑。叶片较大，掌状5裂，裂刻深12-15厘米，叶缘具微波状锯齿，有叶锯，叶色浓绿，叶脉掌状，5基出，叶柄长14-15厘米。夏、秋果兼用品种，以秋果为主。始果节位1-3节，果实个大，卵圆形，果颈明显，果柄0.9-1.8厘米，果径6-7厘米，果形指数0.95，果目微开，不足0.5厘米，果皮金黄色，有光泽，似涂蜡质。果肉淡黄色，致密，单果重70-110克

早黄，又名糖包子，夏秋果兼用品种。果扁圆形，单果重50-70克，果熟时黄色，果顶不开裂，果肉草莓色，风味浓甜，品质上。树势旺，但树姿开张，萌枝率高，枝粗壮，尤以夏梢更盛。该品种果大，品质佳，丰产性强，为鲜食加工用优良品种。早黄，又名新疆早黄、黄蟠，国外目前热炒此品种，称为：Xin Jiang。夏秋果兼用品种。新疆南部阿图什特有早熟无花果品种，耐阴，秋果扁圆形，单果重50-70克，果熟时黄色，果顶不开裂，果肉草莓色，可溶性固形物含量15% - 17%或更高，风味浓甜