

蓝莓树苗 润丰苗木种植公司 安徽树苗

产品名称	蓝莓树苗 润丰苗木种植公司 安徽树苗
公司名称	寿县润丰苗木种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市寿县板桥镇
联系电话	13956118161

产品详情

目前，绝大部分果树都必须经过嫁接才能取得优质高产的效果。每年入秋后至初冬和春季是果苗嫁接的好时机。近年来据一些果农反映，嫁接后的果苗有的长出几片新叶（梢）后不久便枯萎死亡或成活率很低的现象。其原因有如下：砧木和接穗不亲和。即指砧木和接穗嫁接愈合生长能力。这能力的大小取决于两者亲缘的远近。同种的苗木亲和力强，嫁接成活率高；同一属但不同种的苗木嫁接困难或不能成活。其原因是砧木和接穗不亲和，其愈合组织不能联通输导组织，引起导管或筛管阻塞，造成营养交换困难。解决方法：在嫁接果苗时，一定要选用亲和力强、适应性强的品种作砧木。

正确的使用石硫合剂。

混合使用当。随意把石硫合剂和其他农药混合使用，安徽树苗，结果效果不佳。石硫合剂呈强碱性，若与酸性农药混用，蓝莓树苗，二者发生酸碱中和反应，从而降低药效。波尔多液虽也是碱性，油桃树苗，但也不可和石硫合剂混合使用因二者混合后加大了铜的溶解量，铜离子会干扰植物体内酶的活动发生药害。因此果树喷布波尔多液15至20天后才能喷布石硫合剂，而喷过石硫合剂7至10天后才能使用喷波尔多液。石硫合剂也不能与松脂合剂、棉油皂和酸性农药混用使用。如果一定要将石硫合剂和酸性农药混合施用那只能用低浓度的石硫合剂，而且必须随混合随施用不可久贮。

许多果农不重视果树生长期修剪，放任树体生长，结果使主枝与中心干夹角过小，冬剪时又采取在直立旺长的主枝背后多道锯伤的办法来开张角度，桂花树苗，这是很不科学甚至十分有害的。

因为冬季树体处于休眠状态，生命活动极其缓慢，造成的锯口难以愈合，从而导致锯口间树皮坏死，诱发腐烂病，直接影响果树生产。

据有关资料显示，同一主枝随着锯口数的增加，其锯口间的树皮坏死率和腐烂病感1染率均呈明显增加趋势。

蓝莓树苗-润丰苗木种植公司-安徽树苗由寿县润丰苗木种植有限公司提供。寿县润丰苗木种植有限公司（www.ahmiaomu.com）是一家从事“经济林苗,花卉种植”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“润丰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使润丰苗木在花木、果木种苗中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！