

金枫绿化 丛生美国红枫病虫害防治 丛生美国红枫

产品名称	金枫绿化 丛生美国红枫病虫害防治 丛生美国红枫
公司名称	泰安金枫园林绿化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安肥城市孙伯镇
联系电话	15066724999 15066724999

产品详情

美国红枫修剪技能

一、树形选择

美国红枫小苗以树冠优美，枝叶茂盛，应充分利用原有树形，以尽快形成树冠。

二、整型修剪技术

1.当年生苗高可达30-50cm，经过1~2年定植，当基径达1-2cm粗时，在冬季修剪，一般留一主干，剪除基部萌蘖枝及分枝点较低的侧枝，在离地80-100cm处主干短截，细弱苗可略低壮苗可稍高。对主干各主侧枝应选定长势适中，方向适宜枝条，并短截侧枝1/3，使主干与各级主侧枝分布合理，上下几层错落有序。

2.红点红枫每年休眠期，剪除枯枝、病枝、并列、内生枝后，疏除影响主枝生长的辅养枝、徒长枝、重叠枝等，短截生长过旺徒长枝，使树冠保持匀称。逐年剪除生长较低的枝条，以抬高主干分枝点，使树冠内通风透光。注意不要在生长期修剪，以免伤流影响长势。

3.注意随时剪除砧木上的萌芽。高接换头生产大规格红枫，丛生美国红枫，先在适宜部位选留精壮萌芽，养好砧木，然后在春季萌芽前嫁接优良品种。通过2-3年培养，能形成较大树冠用于绿化，但应注意随时剪除砧木上的萌芽。采用粗干劈接的要注意伤口愈合。

4.移植与出圃修剪：小苗可裸根，大苗带泥球。在休眠期移植成活率较高。疏剪过密枝叶，做到树冠通透，树形不变为原则，修剪不宜过重。移植在生长期可多摘叶，注意叶面保湿。

企业视频展播，请点击播放

秋冬交替时节是美国红枫养护的关键时期

秋冬交替时节是美国红枫养护的关键时期。一般而言，要注意以下几点：

搞好施肥 秋后，根系又出现一次生长高峰。因此，应于秋末冬初视美国红枫树龄大小和栽植时间的长短，适当施一些有机肥或化肥，且适量浇水，使肥料渗入。这样可以促发新根，增强树势。

清理杂草落叶 杂草落叶不仅是某些病虫害的越冬场所，而且在干燥多风的冬季易发生火灾。因此，应把绿地中的杂草落叶清理干净，集中处理。

红点红枫移栽成活率是衡量绿化工程成败的关键，丛生美国红枫哪里好，经常因为移栽环节不到位使红点红枫“假活”枯死，严重影响景观效益和经济利益，浪费大量的人力、物力和财力。为提高红点红枫移栽成活率，金枫园林对红点红枫移栽过程中的重点环节进行总结，丛生美国红枫批发，以期为绿化工作提供参考。

一、红点红枫移栽前准备

规划前行，落实责任，严格按照规划要求的数量和规格选苗、定苗，并落实到人。为了保证红点红枫成活，避免疏漏，分工具体，要明确责任，层层落实，丛生美国红枫病虫害防治，将任务分至每一个环节，落实到每一个人，形成一条线管理。任何环节出现问题。都能找到责任人，确保移植红点红枫成活率。

二、整地及土壤改良

城市建设残留较多的建筑垃圾和生活垃圾，甚至有些施工单位就地挖坑将建设垃圾掩埋在整地时一定要全面清除，并按标高整地，避免对掩埋的垃圾不清楚，致使绿地长期浇水造成地基下陷。整地一般不得低于1000px，原为耕地的可酌情考虑。深翻的土壤可用50%多菌灵可湿性粉剂拌入土中消毒，或通过太阳照射消毒使土质疏松一般树种都是喜酸性植物，若遇碱性土壤，可用 $\text{NH}_4\cdot 2\text{Fe}\cdot \text{SO}_4\cdot 26\text{H}_2\text{O}$ 进行改良：若遇喜碱性植物，可用石灰改良酸性土壤。

三、红点红枫起挖

红点红枫起挖的时间和数量根据施工种植现场的准备情况和天气状况等适应确定。尽量做到当天挖、当天运、当天栽，缩短土球或根系暴露在外的时间：尽量选择假植苗或袋苗，少用或不用地栽苗和裸根苗：选择抽枝力、成枝力强的红点红枫和主侧根、毛细根发达的红点红枫：选择有标记无病虫害的红点红枫。

金枫绿化(图)-丛生美国红枫病虫害防治-丛生美国红枫由泰安金枫园林绿化有限公司提供。泰安金枫园林绿化有限公司（www.jinfenglvhua.com）是从事“丛生红点红枫,美国红点红枫,美国红火箭紫薇,火焰卫矛扦插苗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司（www.hyntzjg.com）还是从事火焰南天竹扦插苗价格，火焰南天竹基地，火焰南天竹供货商的厂家，欢迎来电咨询。

