

2米白皮松价格///2米白皮松价格

产品名称	2米白皮松价格///2米白皮松价格
公司名称	山西祺隆园林绿化工程有限公司
价格	100.00/棵
规格参数	
公司地址	山西省运城市绛县古绛镇峪南村195号（注册地址）
联系电话	13467240585

产品详情

2米白皮松价格///2米白皮松价格，联系13467240585，微信同号。山西鹏程苗木出售白皮松，工程绿化白皮松，行道树白皮松，1米-2米-3米白皮松，4米白皮松，5米白皮松。出售各种规格白皮松苗、油松苗、雪松苗，黑松苗，华山松 销售3-10公分国槐 龙爪槐、香花槐 毛刺槐

金丝垂柳苗、直柳、青皮垂柳、桐树苗 侧柏苗、塔柏苗、松柏苗 元宝枫苗、五角枫苗、金叶女贞 新疆杨，毛白杨苗、速生杨 冬青、高干冬青，大叶黄杨，小叶黄杨，杜仲苗、榆树苗、香椿苗 银杏苗、冬青、红叶小波，紫叶李白皮松在连续多日大面积的雾霾和沙尘天气里，迎来了我国第三十二个植树节，有没有哪些树种对降低PM2.5、防控大气细颗粒物污染起到一定的作用？从事城市生态学和城市林业及全球变化与森林生态功能研究的上海交大农业与生物学院教授刘春江，在接受媒体采访时表示，应当充分发挥城市森林的绿肺”功能，调节气候，吸纳颗粒物。刘春江课题组成员殷杉博士说，由于叶片表面粗糙，表皮毛丰富，再加上可以分泌一些黏性物，因此可成功地将细小的颗粒物滞留在表面，甚至将一部分PM2.5吸纳到叶片气孔内部。白皮松（学名：Pinus bungeana Zucc.）是常绿乔木，枝轮生，冬芽显著，芽鳞多数，覆瓦状排列。嫩枝上长有针叶，针叶是着生在枝叶交接处的节状叶枕上，每根松针的外围都有一层厚厚的角质层和一层腊质的外膜，这样就减少了松树身上水份的丧失，保证该物种可以在很干燥的环境下生存。球果第二年秋季成熟。是中国特有树种之一，树形多姿，苍翠挺拔，别具特色，早已成为华北地区城市和庭园绿化的优良树种。近年白皮松已引种美国，世界瞩目。

乔木，高达30米，胸径可达3米；有明显的主干，或从树干近基部分成数干；枝较细长，斜展，形成宽塔形至伞形树冠；幼树树皮光滑，灰绿色，长大后树皮成不规则的薄片脱落，露出淡黄绿色的新皮，老则树皮呈淡褐灰色或灰白色，裂成不规则的鳞状块片脱落，脱落后近光滑，露出粉白色的内皮，白褐相间成斑鳞状；一年生枝灰绿色，无毛；冬芽红褐色，卵圆形，无树脂。针叶3针一束，粗硬，长5-10厘米，径1.5-2毫米，叶背及腹面两侧均有气孔线，先端尖，边缘有细锯齿；横切面扇状三角形或宽纺锤形，单层皮下层细胞，在背面偶尔出现1-2个断续分布的第二层细胞，树脂道6-7，边生，稀背面角处有1-2个中生；叶鞘脱落。雄球花卵圆形或椭圆形，长约1厘米，多数聚生于新枝基部成穗状，长5-10厘米。球果

通常单生，初直立，后下垂，成熟前淡绿色，熟时淡黄褐色，卵圆形或圆锥状卵圆形，长5-7厘米，径4-6厘米，有短梗或几无梗；种鳞矩圆状宽楔形，先端厚，鳞盾近菱形，有横脊，鳞脐生于鳞盾的中央，明显，三角状，顶端有刺，刺之尖头向下反曲，稀尖头不明显；种子灰褐色，近倒卵圆形，长约1厘米，径5-6毫米，种翅短，赤褐色，有关节易脱落，长约5毫米；子叶9-11枚，针形，长3.1-3.7厘米，宽约1毫米，初生叶窄条形，长1.8-4厘米，宽不及1毫米，上下面均有气孔线，边缘有细锯齿。花期4-5月，球果第二年10-11月成熟。心材黄褐色，边材黄白色或黄褐色，质脆弱，纹理直，有光泽，花纹美丽，比重0.46。[2]

编辑本段生态环境

为喜光树种，耐瘠薄土壤及较干冷的气候；在气候温凉、土层深厚、肥润的钙质土和黄土上生长良好。喜光、耐旱、耐干燥瘠薄、抗寒力强，是松类树种中能适应钙质黄土及轻度盐碱土壤的主要针叶树种。在深厚肥沃、向阳温暖、排水良好之地生长最为茂盛。对二氧化碳有较强的抗性。

白皮松一般生长在海拔500-1000米的山地石灰岩形成的土壤中，但在气候冷凉的酸性石山上或黄土上也能生长。对零下30℃的干冷气候，PH值7.5-8的土壤仍能适应。能在石灰岩地区生长，而在排水不良或积水地方不能生长。对二氧化硫及烟尘的污染有较强的抗性。

白皮松(图5)

木材可供房屋建筑、家具、文具等用材；种子可食；绿化用四季常绿，树姿优美，树皮白色或褐白相间、极为美观，为优良的庭园树种。纹理直，轻软，加工后有光泽和花纹，供细木工用。其树姿优美，树皮奇特，可供观赏。[6]

编辑本段园林用途

白皮松在园林配置上用途十分广阔，它可以孤植，对植，也可丛植成林或作行道树，均能获得良好效果。它适于庭院中堂前，亭侧栽植，使苍松奇峰相映成趣，颇为壮观。

干皮斑驳美观，针叶短粗亮丽，是一个不错的历史园林绿化传统树种，又是一个适应范围广泛、能在钙质土壤和轻度盐碱地生长良好的常绿针叶树种。孤植、列植均具高度观赏价值。

白皮松形态(31张)

白皮松为常绿乔木，幼树树皮平滑，灰绿色，老树树皮不规则脱落后露出粉白色内皮，衬以青翠的树冠，十分美观。同时，白皮松对二氧化硫及烟尘的污染有较强的抗性，早已成为华北地区园林绿化的优良树种。近年来由于大规格白皮松苗木供不应求，培育壮苗大苗已成为工作重点。

选好圃地白皮松幼苗怕涝，育苗地要选平坦、有排灌条件的地块。重粘土地、盐碱土地、低洼积水地不宜作育苗地。

精细整地：育苗地要深翻整平耙细，施足底肥，如腐熟的圈肥、堆肥。也可将过磷酸钙与饼肥或土杂肥等混合使用，效果更好。整地前每亩撒施10公斤硫酸亚铁粉末，翻入土中进行杀菌消毒。土地整好后，做成南北向畦田，畦埂高25厘米，畦宽1米，以备播种。种子催芽处理白皮松种子要用波尔多液浸种消毒，播前用温水(50℃至60℃)浸种催芽或混沙层积催芽，咧嘴种子数达到种子总数的50%时即可播种。这样出苗壮且整齐，一般在15至20天即可出土发芽。

播种播种一般在土壤解冻后10至15天(3月下旬至4月初)为最好。播前畦面浇透水，每10平方米播种1至1.5公斤，可产苗1500株左右，采用宽幅条播或撒播。播后盖细沙土1至1.5厘米，每亩用扑草净125克加25%的可湿性除草醚250克对水25公斤，用喷雾器洒在苗床上除草。最后在畦面上搭小拱棚增温保湿，提高出苗率，出苗前不用浇水。因老鼠爱吃松子，在搭拱棚盖薄膜前，要往畦面上撒些老鼠药。

苗期管理待幼苗出齐后，逐渐加大苗床通风时间，通过炼苗增强其抗性。白皮松喜光，但幼苗较耐荫，去掉薄膜后应随即盖上遮阴网，以防高温日灼和立枯病的危害。

久旱不雨或夏季高温要及时浇水。除草要掌握除早、除小、除净的原则，株间除草用手拔，以防伤害幼苗。撒播苗拔草后要适当覆土，以防裂缝。条播苗除草和松土结合进行，间苗和补苗同时并举。而后要及时排水。

白皮松幼苗应以基肥为主，追肥为辅。从5月中旬到7月底的生长旺期进行2至3次追肥，以氮肥为主，追施腐熟的人粪尿或猪粪尿每亩3担，加水20担左右，腐熟饼肥每亩5至15公斤对成饼肥水15担左右，每亩施尿素4公斤左右。生长后期停施氮肥，增施磷、钾肥，以促进苗木木质化，还可用0.3%至0.5%磷酸二氢钾溶液喷洒叶面。

白皮松幼苗生长缓慢，宜密植，如需继续培育大规格大苗，则在定植前还要经过2至3次移栽。两年生苗可在早春顶芽尚未萌动前带土移栽，株行距20至60厘米，不伤顶芽，栽后连浇两次水，6至7天后再浇水。4至5年生苗，可进行第二次带土球移栽，株行距60至120厘米。成活后要保持树根周围土壤疏松，每株施腐熟有机肥100至120公斤，埋土后浇透水，之后加强管理，促进生长，培育壮苗。