

车厘子樱桃树苗价格、2020年车厘子樱桃树苗价钱及报价

产品名称	车厘子樱桃树苗价格、2020年车厘子樱桃树苗价钱及报价
公司名称	泰安裕农农业科技有限公司
价格	6.60/棵
规格参数	品种:嫁接苗 公司:裕农农业 产地:泰安
公司地址	泰安市徂汶景区滨河片区南店子村（注册地址）
联系电话	15550832222

产品详情

车厘子樱桃树苗价格、2020年车厘子樱桃树苗价钱及报价 不同时期的果树的修剪原则是：幼树疏除中干上过旺的直立主枝和主枝上过旺的徒长枝，对保留下的主枝和主枝上的侧生枝以拉枝开张角度和刻芽为主，主枝开张角度60-70度为宜，侧枝开张角度70-80度为宜，拉枝时要拉成一条线，切忌拉成弓形，刻芽一般在3月上旬芽萌动前进行，在主枝上以促发侧枝为目的。防治方法：

- （1）选购种植无病苗木，用生物抗菌剂K84或3-5° Be石硫合剂浸根消毒，
- （2）加强肥水管理，促使根系健壮生长，避免在根颈部造成伤口，对已出现的伤口及时消毒保护，
- （3）发现病瘤应彻底切除并销毁，用1%硫酸铜液或50倍液的抗菌剂402、5° Be石硫合剂切口消毒，外涂凡士林保护。在霜冻来临时应人工熏烟，熏烟不仅能提高果园气温2-4度还可通过产生的烟幕阻止地面热量的散发而使果园气温下降速度减缓，避免或减轻危害。

适期浇好5次水：1、花前浇水在发芽至开花以前，浇水满足展叶、开花对水分的需求，这次浇水可降低地温，延长花期，有时可避免过晚霜冻的危害，2、硬核期浇水在落花后10-15天进行，此时大樱桃生长发育旺盛，对水分的供应敏感，缺水会造成大量果核软化的柳黄果，浇水比不浇水的柳黄果平均减少38.7%。防治方法：

- （1）选购种植无病苗木，用生物抗菌剂K84或3-5° Be石硫合剂浸根消毒，
- （2）加强肥水管理，促使根系健壮生长，避免在根颈部造成伤口，对已出现的伤口及时消毒保护，
- （3）发现病瘤应彻底切除并销毁，用1%硫酸铜液或50倍液的抗菌剂402、5° Be石硫合剂切口消毒，外涂凡士林保护。

樱桃采摘完施基肥 樱桃与其他果树不同，其花芽分化时间较早，一般在果实采摘结束后树体即进入花芽分化期，为了促进植株花芽分化，保证树体营养供应，果农一定要在樱桃采摘结束后不间断地进行叶面追肥，并在40天内及时施入优质基肥，绝不能等到秋季一次“算账”。春季病虫害防治措施

- 1、清园，3月底以前进行清园把地面的杂草、落叶等开沟埋入地下消灭越冬的病虫菌源，
- 2、喷布5波美度石硫合剂，3月上旬芽体萌动时均匀细致地喷布5波美度石硫合剂，用药要求树上及地下均匀覆盖，这样可大大减轻当年病虫害危害的程度。

在樱桃初花期、盛花期前后各喷“云大-全树果”1500倍-2000倍1-2次，能充分促进花粉芽和花粉管的正常发育和伸长，显著提高座果率，同时有助于授粉受精减少花果脱落。

花果管理是一项提高樱桃果实品质的必要技术，但具体到实际不仅是花期及采果前期的管理也渗透到修剪措施、肥水调控等诸多环节。

温湿度管理 甜樱桃在7.2 低温下经1100~1400小时方能解除休眠，此时才可开始扣棚并加盖草帘，扣棚覆膜后，要逐步增加白天揭草帘的次数，使大棚内温度逐渐升高，从萌芽到采收各物候期的温度指标为：扣棚至发芽前，白天12~18℃，夜间5~6℃，升温要缓慢进行；发芽至开花期，白天18~21℃，夜间6~7℃；落花至果实膨大期前，白天18~21℃，夜间7~8℃；果实膨大期，白天22~25℃，夜间10~20℃。

岱红樱桃苗：早熟大果甜樱桃品种，岱红是山东农业大学选育，平均单果重10.85克，大果可达14.2克，果实为圆形，果型端正，整齐美观，畸形果很少，果柄短，平均果柄长2.24厘米，果皮鲜红至，富光泽，色泽，果，近核处，果肉半硬，味甜适口，可溶性固形物14.8%，烟台5月中、下旬成熟，比红灯早熟3-5天，抗裂果，树势，枝条，花芽多，成花率高，早产早丰，是极少见的早产、早丰、大果形早熟品种，也是目前保护地栽培的品种之一。

不同时期的果树的修剪原则是：幼树疏除中干上过旺的直立主枝和主枝上过旺的徒长枝，对保留下的主枝和主枝上的侧生枝以拉枝开张角度和刻芽为主，主枝开张角度60-70度为宜，侧枝开张角度70-80度为宜，拉枝时要拉成一条线，切忌拉成弓形，刻芽一般在3月上旬芽萌动前进行，在主枝上以促发侧枝为目的。

春季病虫害防治措施

1、清园，3月底以前进行清园把地面的杂草、落叶等开沟埋入地下消灭越冬的病菌源，2、喷布5波美度石硫合剂，3月上旬芽体萌动时均匀细致地喷布5波美度石硫合剂，用药要求树上及地下均匀覆盖，这样可大大减轻当年病虫害危害的程度。