## 连翘苗 品种纯正成活率高 连翘苗 耐寒耐旱

产品名称	连翘苗 品种纯正成活率高 连翘苗 耐寒耐旱
公司名称	绛县晋航苗木种植专业合作社
价格	.00/个
规格参数	连翘苗:连翘苗 2年连翘苗:2年连翘苗 山西连翘苗:山西连翘苗
公司地址	山西运城绛县柴家坡村
联系电话	13223596889

## 产品详情

连翘苗 品种纯正成活率高 连翘苗 耐寒耐旱【13834107921柴先生】药用连翘苗 2年连翘苗

连翘对土壤条件要求不高,但以选择向阳、排水良好的沙质土壤或中壤土地栽培为宜,可根据当地情况 在缓坡山地、退耕还林地栽植。建议成片造林,以便后期管理。连翘属落叶灌木,气微香,味苦,具有 清热解毒、利尿排石及散结消肿等功效,

对于风热感冒、淋巴结结核及尿路感染有较强疗效,在我国主要分布在河南、河北、山西、陕西、山东 等地区,多见于山坡、林下或草丛中,是我国出口药材之一,市场需求量较大。目前,我国有多个大面 积连翘种植基地,人工栽培面积逐渐扩大。

在连翘的大面积栽培中,应根据其生长习性进行合理规划、科学种植,以提高栽培产量和质量。生长习

连翘喜欢光照充足的环境,有一定的耐荫性,具有耐寒、耐旱、怕涝等特点,对土地条件要求不高。连 翘的萌生能力较强,在适宜的环境条件下能较快地增加分株数量,生长范围会逐年扩大。

连翘枝条更替较快,萌生枝以及萌生枝上发出的短枝会随着树龄的增长而不断减少。有关数据显示,连翘在生长到第4年的时候,其萌生枝上的一年生短枝是比较多的,但以后会逐年减少。在连翘的生长过程中,尽管植株会不断抽生新的短枝,但长出的新枝逐渐向外倾斜,所以其高度及冠幅比较稳定

科学栽植培连翘时,应依据高产、优质及抗逆性强的标准,选取适合当地土壤、气候条件的品种,再从中选择优良单株,然后对选出的植株进行单株繁殖。

连翘对土壤条件要求不高,但以选择向阳、排水良好的沙质土壤或中壤土地栽培为宜,可根据当地情况 在缓坡山地、退耕还林地栽植。建议成片造林,以便后期管理。精细化管理中耕除草。定植后,每年都 要依据连翘的生长状况,不定期进行中耕除草,防止杂草与连翘争夺养分,为其正常生长创造良好环境 科学施肥。栽植后,应于每年冬季松土除草,并在连翘植株旁挖穴或开沟施入腐熟有机肥,一般幼树每株施有机肥2千克,结果树每株施10千克。施肥后覆土,同时壅根培土,以促进连翘多开花结果。灌溉与排水。遇旱要及时灌水。若山区灌溉条件不足,可以修筑小水库等引水上山。

由于连翘最怕水淹,因而雨季要及时排水,以免积水导致烂根。山区种植园要根据地势修建排水沟,以利于及时排水。整形修剪。在连翘植株高1米左右时,于冬季落叶后,在距地面70厘米处剪去顶梢;于夏季进行摘心,去除顶端优势,使其多发分枝.

并从不同方向选择几个发育较好的侧枝培养成主枝。经过几年的整形修剪,使植株形成低干矮冠、内空外圆、通风透光的自然开心形树形。病虫害防治。由于连翘本身具有较强的杀菌、杀虫功能,因而其发生病虫害的概率较小,常见害虫有钻心虫、蜗牛及蝼蛄等。

钻心虫会钻蛀到连翘枝干中生活,有的直接毁坏收获部分,也有的破坏植物输导组织,造成部分组织枯死,甚至整株枯死。为了从根本上消灭害虫,可以在每年冬季清除枯枝败叶,破坏害虫的生存空间,消灭越冬虫卵。

采收与加工连翘定植3年后可开花结果。青翘一般于8月下旬进行采摘,然后用沸水煮片刻或用蒸笼蒸30分钟,取出晒干即可。青翘以身干、不开裂、色青为佳。黄翘一般于霜降前后(10月上旬),果实颜色由青色变为土黄色时采收,收后晒干即可。

黄翘以身干、瓣大、壳厚及色黄者为佳。留种时,以选择生长良好、无病虫害的优良植株所结的成熟果 实为宜,将采摘的成熟果实放在阴凉通风处进行阴干,然后选取果实饱满的种子进行沙藏。

精细化管理中耕除草。定植后,每年都要依据连翘的生长状况,不定期进行中耕除草,防止杂草与连翘争夺养分,为其正常生长创造良好环境。科学施肥。栽植后,应于每年冬季松土除草,并在连翘植株旁挖穴或开沟施入腐熟有机肥,一般幼树每株施有机肥2千克,结果树每株施10千克。

施肥后覆土,同时壅根培土,以促进连翘多开花结果。灌溉与排水。遇旱要及时灌水。若山区灌溉条件不足,可以修筑小水库等引水上山。由于连翘最怕水淹,因而雨季要及时排水,以免积水导致烂根。山区种植园要根据地势修建排水沟,以利于及时排水。

整形修剪。在连翘植株高1米左右时,于冬季落叶后,在距地面70厘米处剪去顶梢;于夏季进行摘心,去除顶端优势,使其多发分枝,并从不同方向选择几个发育较好的侧枝培养成主枝。经过几年的整形修剪,使植株形成低干矮冠、内空外圆、通风透光的自然开心形树形。

病虫害防治。由于连翘本身具有较强的杀菌、杀虫功能,因而其发生病虫害的概率较小,常见害虫有钻心虫、蜗牛及蝼蛄等。钻心虫会钻蛀到连翘枝干中生活,有的直接毁坏收获部分,也有的破坏植物输导组织,造成部分组织枯死,甚至整株枯死。

为了从根本上消灭害虫,可以在每年冬季清除枯枝败叶,破坏害虫的生存空间,消灭越冬虫卵。采收与加工连翘定植3年后可开花结果。青翘一般于8月下旬进行采摘,然后用沸水煮片刻或用蒸笼蒸30分钟,取出晒干即可。

青翘以身干、不开裂、色青为佳。黄翘一般于霜降前后(10月上旬),果实颜色由青色变为土黄色时采收,收后晒干即可。黄翘以身干、瓣大、壳厚及色黄者为佳。留种时,以选择生长良好、无病虫害的优良植株所结的成熟果实为宜,将采摘的成熟果实放在阴凉通风处进行阴干,然后选取果实饱满的种子进行沙藏。

连翘属落叶灌木,气微香,味苦,具有清热解毒、利尿排石及散结消肿等功效,对于风热感冒、淋巴结 结核及尿路感染有较强疗效,在我国主要分布在河南、河北、山西、陕西、山东等地区,多见于山坡、 林下或草丛中,是我国出口药材之一,市场需求量较大。