

罗亚理樱桃苗报价 罗亚理樱桃苗基地

产品名称	罗亚理樱桃苗报价 罗亚理樱桃苗基地
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	10.00/棵
规格参数	
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

产品详情

罗亚理：该品种为Zaiger Genetics,Inc育成的极早熟短低温甜樱桃品种，2002年品种登录。该品种果实大，椭圆形，单果重约10克，红皮红肉，风味极好，可溶性固形物18%，果肉硬度极高，耐储运，果实成熟后在树上14天仍然可以保持相当高的硬度。加州弗雷斯诺地区在5月上旬成熟，比宾库早10天，丰产性极好。自交不亲和，罗亚明（RoyalMinnie）作为授粉树。树势直立，适应性好，抗裂果。一般认为该品种低温需冷量为300-400时，在洛杉矶和南非等暖地栽培区可以正常栽培。在南非仅100小时低温的地区甚至没有几乎没有低温的Socal'szone24区仍然可以正常生长结果。

农民种樱桃须知，樱桃的花芽分化包括生理分化和形态分化两个阶段。花芽生理分化在果实采收后10天左右进行，此时花芽开始大量分化，整个分化期需一个半月左右完成。花束状果枝和短果枝上的花芽在硬核期就开始分化。叶芽萌动后，长成具有6~7片叶簇的新梢基部各节，其腋芽多能分化为花芽，第二年可结果。

花芽形态分化期在7~8月份，此期为气温高、多雨季节，所以要加强土肥水管理，否则树体出现营养不良会影响花芽质量，甚至出现雌蕊败育花。但是高温、干旱的年份，花芽常发育过度，出现大量双雌蕊花形成畸形果，从而影响果实品质。

可以通过改善树体结构，提高树体的光合作用促进花芽分化，并结合夏季剪枝来调节树体结构，使树体营养更平衡。具体可以从以下6方面入手：

方法有拉枝、坠枝别枝、拿枝等,最常用的是拉枝。拉枝是整形、缓势促花的重要手段，可缓和树体顶端和先端优势，改善光照，促使枝条的中后部多出短枝，提早结果。拉枝在3月下旬树液流动后或6月底采收后进行。因甜樱桃分枝角度小，过晚拉枝易劈裂、流胶，所以幼树拉枝早，一般在定植第二年即开始。拉枝的同时需配合刻芽、摘心、扭梢等措施，以增加发枝量，减少枝条无效生长。

摘心可控制枝条旺长，促发二次枝，增加枝量，促进成花。摘心可分为早期摘心和生长旺季摘心。早期摘心一般在花后10天左右进行，幼嫩新梢保留10厘米左右把顶端摘除，摘心后,除顶端发生1条中枝以外，其他各芽均可形成短枝。早期摘心主要用于控制树冠和培养小型结果枝组。生长旺季摘心在5月下旬至7月中旬进行，旺枝留40厘米左右把顶端摘除，可以增加枝量;对幼树连续2~3次摘心能促进短枝形成，提早结果。

大樱桃种植基地位于五岳独尊的泰山脚下，南临孔子故里--曲阜、京沪铁路、京沪高速公路、104国道的泰安市，地理位置优越，交通发达。大樱桃树种植100余亩，与农户联营500余亩，年产大樱桃几万余斤，产品销往全国各地。苗木种植万余亩，以经营大樱桃苗、蓝莓苗为主，同时为大型采摘园的规划及建设提供技术支持。大樱桃苗常备品种20多个，规格1-8公分的苗木齐全。大樱桃优质砧木：大青叶、山樱、马哈利、马扎德、矮化大樱桃苗；吉塞拉5号，6号，1号，兰丁M2，兰丁M4。每年出产大量的大樱桃成苗木及蓝莓苗，可满足全国不同数量要求的客户。