

3公分梨树苗 皇冠梨树哪些品种适合大量栽种

产品名称	3公分梨树苗 皇冠梨树哪些品种适合大量栽种
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	品牌:岳美 型号:3公分 产地:山东
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

梨树苗管理

一：冬季修剪及施肥注意事项

1：幼龄树根据确定的树形，进行整形修剪。原则为轻剪长放，多留枝，保持健壮的树势，早日成形，适期结果。盛果期树维持中庸树势，枝组细致修剪，高产稳产，不要形成大小年。

2：每年或隔年在修剪之后，应给树干、主枝骨干枝刮皮，以防除活在树皮缝中越冬隐藏的红蜘蛛、食心虫类害虫卵。对患有腐烂病的梨树应将病疤处的树皮刮净，并刮至木质部。刮下的树皮应立即烧掉。

3：提倡秋施基肥，但对上年未秋施基肥的树，应在此时期施完基肥。

二：春季追肥补水喷管理注意事项

1：梨树全年的施肥量，可按照年平均产量计算，一般亩产50kg果实，是纯氮肥150-200g，氮磷钾的比列可按1:0.4:1施用。

2:3月下旬梨树芽膨大期可喷4-5度的石硫合剂，或40%富美200倍越冬病虫害。梨大食心虫危害果园严重的在梨大食心虫转芽时，喷1500倍50%敌百虫，或1000倍50%辛硫磷乳剂，

或40%水硫磷+害立平或0.3%洗衣粉，兼治梨实蜂、星毛虫、梨瘦华蛾等。

3：梨花期易发生霜冻的果园，可在临近开花期浇水1次，减轻冻害。

三：疏花、授粉、疏果注意事项

1：从花序伸出至开花末期进行疏花，要视植株上花量的多少进行：对弱花序、弱枝组上的花序、延长果枝头上的花序、着生在枝杈间的花序、枝组缙部的花序、大年时长果枝的枝顶和腋处着生的花序，全部疏除。疏花后的花序间距可以根据不同品种果型的大小适度留取。对上强下弱、外强内弱的树，上强枝上的花序应少疏或者不疏，弱枝、枝、角度小的枝，中小型果的花序应多疏。坐果率低的品种少疏。花期遇到雨或有风害时应不疏。疏除整个花序时，留下叶簇，因叶簇处能形成新的花序。

2：缺少授粉树或授粉不足的果园，在开花期要进行人工授粉。

3：疏花以后，坐果率仍很高，单株负载量大时，需要进行疏果，疏果时间在幼果脱去花萼时进行。花萼不脱落时，在第3次生理落果以后进行。

四：虫果、施肥注意事项

1：摘除受梨大食心虫危害的果、象鼻虫危害的果。

2:5月下旬应追施全年计划施用氮肥的1/3-2/3。如有草木灰等钾肥，也可在此时施用追肥之后要灌水、松土、除草。5月下旬开始，每15天左右要页面喷施1次尿素（0.3-0.4%）和磷酸二氢钾（0.2-0.3%），或绿芬威、绿风95等叶面肥连喷2-3次。根据天气情况进行灌水1-2次。

五：喷、吊枝、撑枝注

我们的地址：山东省泰安市岱岳区北集坡镇李家庄电话：13335292778联系手机：13335292778
期待您的咨询

意事项

1:6月中旬喷石灰倍量式200倍波尔多液，对易受害的品种可喷石灰倍量式400倍波尔多液，也可以用50%多菌灵800倍液。7月中旬左右以防梨小食心虫为主，可以喷1000倍50%辛硫磷或1000倍50%乳剂，以梨黑星病为主的梨园，喷石灰倍量式200倍波尔多液，红蜘蛛严重时加3500倍扫螨虫净，若梨小食心虫和黑星病可喷800倍50%多菌灵。8月中旬左右在喷一次波尔多液，黑星病和轮纹病，加500倍50%敌百虫，梨小食心虫和刺蛾。

2：对结果多的大树的大枝，应该用绳吊起来或用支柱支撑起来，防止果枝被压折。幼树主枝角度直立者，可进行撑枝、拉枝、开张角度。

3：晚熟品种，在8月中旬或下旬，在树干周围绑上稻草，引诱梨小

虫在次越冬，待落叶前将草帮解下烧掉。