

5公分李子苗 味帝李子苗一亩栽植多少根

产品名称	5公分李子苗 味帝李子苗一亩栽植多少根
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	品牌:岳美 型号:5公分 产地:山东
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

李子苗有自花现象，因而，栽培品种不宜单一，应隔一定距离栽植花期一致的不同品种做授粉树，比例为4：1或8：1。

一、肥水管理捉2个或3个活的白星金龟子成虫放入啤酒瓶中，就会引其他成虫飞到瓶中。李小食心虫等可用2.5%的3000倍液，或50%的辛硫磷800倍液+40%的800倍液，或20%的杀灭菊酯3000倍液。流胶病的发生与、冻害、大青叶蝉的危害有关，所以在修剪上尽量减少大的创伤，大的剪口要用药进行处理。大青叶蝉发生时期要注意用药防治。已经发生了流胶病的树，把流胶刮除，涂抹硫悬浮剂即可。防治红蜘蛛关键是要抓准防治时期，一定要在麦收前把它消灭掉，可用吡虫啉与齐螨素的混合液进行防治或用40%的三氯杀螨醇乳油倍液防治。时刻。一般在秋季落叶后至春季发芽前均可定植。春旱地区秋季定植，无春旱则以2月中下旬定植为佳。密度。株行距2×4m或3×3m或2×3.5m或2×3m亩栽76-111

株。

（一）施肥

1、基肥 基肥是能较长时间供给李子苗多种养分的基本肥料，一般以迟效农家肥为主，如堆肥、厩肥、作物秸秆、绿肥、落叶等。基肥秋施为好，成年李子苗，基肥每株施农家肥50—100公斤。

2、追肥

（1）花前追肥：可在李子苗萌芽前10天（4月上旬），株施0.5—1公斤性氮肥或25公斤腐熟人粪尿。

（2）花后追肥：应及时追施性氮钾肥，以减少生理落果，在5月下旬至6月中旬，株施0.5公斤。

（3）果实膨大和花芽分化期追肥：在生理落果后至果实进入迅速膨大期前（6月下旬至8月中旬），追施氮、磷、钾复合肥，株施0.5—1公斤。

（4）果实生长后期追肥：在果实开始着色至采收期间追肥。此次以磷、钾肥为主，氮肥以叶面喷施为好，浓度为0.2—0.3%，结合喷药进行。

(二) 灌水李子苗在一年中各个物候期都需要一定水分，萌芽前和幼果膨大期，新梢生长期应进行灌溉，入冬前需灌一次封冻水，另外，李子苗怕涝，故李园应修排水系统，以免遭受涝害。

二、修剪

(一) 树形 树形常采用自然开心形和双层疏散开心形。自然开心形的特点是通风透光，内膛和下部的枝组结实率高，寿命长，便于管理。双层疏散开心形树体结构是一层主枝3个，层间距80厘米左右，二层主枝2个，以上落头开心。

(二) 修剪

1、幼树期 自然开心形：定植当年在距地面40~60厘米剪截定干。剪口下一芽要迎着风向（西南），剪口要呈斜面。斜面上高于芽尖，斜面下方与芽基部相平或略高。二年春季在定干当年新发出的枝选3~4个向四周分布的枝条作主枝（如不够可下年选）。疏除过密枝，不密的枝条留作辅养枝。根据各主枝的生长情况适当短截，剪去全长的。第三年春季修剪，在每个主枝中分别选1个角度开张，生长强壮的枝条作为主枝的处长枝，进行短截，剪去全枝的1/2左右，并在每个主枝下部选1~2个向外生长的枝条作为侧枝，短截1/3左右。主枝上着生5厘米以下的小枝尽量多留，培养成短果枝或花束状果枝，中、长果枝适当短截。这样，经3~4年树形已基本确定，以后每年主、侧枝的延长枝修剪方法与上一年相同。还可作根外追肥。如果施用不当，不仅造成肥料的浪费，而且还会引起“肥害”，损害作物。因此，在施用尿素时必须留意“八忌”。一忌：与碱性肥料混施或同时施。碱性肥料包括草木灰、石灰、钙

期待您的咨询

镁磷肥、钢渣磷肥等。如混尿素施或同时施，则会加剧尿素中的氮素变成氨而挥发。因此，夏秋季节，尿素与碱性肥应错开3至4天施用，冬春季节应错开7至8天。二忌：作种肥。尿素作种肥，因为集中的缩二脲的毒害作用会使种子失去发芽力，并危及幼苗。同时，因为高浓度的尿素能损坏种子的蛋白质结构，对种子也有毒害和抑制造用，故不宜作种肥。若必须作为种肥施用时，要避免种、肥接触，并节制用量。三忌：施后立刻浇水。酰胺态的氮素，与泥土胶体间的吸附能力很低。