

# 老鼠药、灭老鼠、杀鼠剂、.0.5%溴敌隆母液.

产品名称	老鼠药、灭老鼠、杀鼠剂、.0.5%溴敌隆母液.
公司名称	淮北市绿森有害生物防治有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:大卫 型号:0.5% 规格:100x150x250 ( mm )
公司地址	安徽省淮北市相山区相山路东侧环保路南2幢208号
联系电话	86-05613186290 13355616290

## 产品详情

品牌	大卫	型号	0.5%
规格	100x150x250 ( mm )	净重	450 ( g )
产地	河南省商丘	保质期	24 ( 个月 )
有效物质	0.5 ( % )	执行质量标准	Q/CYLHX012
箱装数量	5gx90	贸易属性	厂家直销
产品类别	灭鼠/杀虫剂		

包装规格	5gx90支	5gx100袋
	50mlx20瓶	250mlx20瓶
	500mlx20瓶	

农药登记证号：ls20001528生产批准证书号：hnp11016-h0046产品标准号：q/cylhx012

产品性能：溴鼠灵是一种适口性极佳的第二代抗凝血性杀鼠剂，毒饵内含有我公司特制的引诱剂和保鲜剂，并加入苦味剂以防误食，一次投饵就能有效控制大小鼠类，鼠类吃此药后死与内出血

使用范围：家庭、机关、餐饮业、仓库、地下管道、垃圾厂、畜禽厂、饲料厂、食品加工厂、机场、火车、商店等。

使用说明及使用剂量：把毒饵放在老鼠经常出没的地方，3到5天间歇期后，再补充饵料。

地下管道：30克/5米（10颗）室内用：10-20克/15米（4-7颗）

注意事项：若皮肤粘上药剂后及时清洗。严禁人畜误食，误食者送医院急救，维生素k1是本药的特效解毒药。随时注意收集鼠尸深埋。本品应储存与阴凉、干燥、通风处。置于儿童接触不到的地方，不能与

食品混放。

## 中国鼠害与卫生虫害防止协会专家委员会认定产品

老鼠防治 灭老鼠 杀老鼠 专业灭老鼠公司 办公室灭老鼠 家庭灭老鼠 仓库灭老鼠 工厂灭老鼠 大厦杀老鼠  
鼠害是一个严重的世界性问题。全球每个角落的居民都受到鼠害的威胁，因为地球上家栖鼠类的数量大大超过所有的人口，据估计，鼠的数量是人口的3—4倍。

我国城镇主要的鼠种通称家栖鼠类，包括：褐家鼠、黄胸鼠和小家鼠。鼠类可以直接把病菌传播给人类，或通过体外寄生虫间接传给人类，起着传播媒介和保菌作用。我国鼠传的疾病主要有鼠疫、钩端螺旋体病、流行性出血病、鼠型斑疹伤寒、血吸虫病、旋毛虫病、沙门氏菌类病等。>家栖鼠具有寿命短、繁殖力强、性成熟早特点，平均寿命为6-7个月；雌鼠年平均繁殖幼鼠35只；幼鼠性成熟时间70天。三种家鼠都为杂食性的，但喜欢的物品取决于以往的经历和环境所提供的种类。褐家鼠和黄胸鼠的食性很广，如各种谷物、肉类、水果、垃圾、动物粪便、还有各种昆虫、蔬菜、野草和草籽等。灭鼠剂分为急性灭鼠剂和抗凝血灭鼠剂两类。目前，由于急性灭鼠剂对人畜安全影响较大，且没有特效的解毒剂而多数被国家所禁用；抗凝血类的灭鼠剂是使用最为安全、效果最好的慢性灭鼠剂（维生素K1是特效的解毒剂），常见抗凝血类灭鼠剂有杀鼠灵、杀鼠迷、敌鼠钠盐、氯敌鼠、溴敌隆，抗凝血灭鼠剂毒饵连续投放4—10天，剩余的毒饵不清除，或采用毒饵盒长期投放可以完全控制该地的鼠患，一般在毒饵投放的第3—4天其消耗量达到高峰，随即出现鼠尸，10—15天可完全杀灭该范围内的鼠类。

灭鼠方法很多，我公司通过物理学、化学、生物学、生态学方式灭鼠，具体如下：一、灭鼠方杀老鼠  
灭老鼠 灭老鼠专家 办公室杀老鼠 老鼠药 老鼠胶 老鼠笼 灭老鼠公司 专业灭老鼠公司  
1、环境灭鼠：老鼠需要水、食物以及隐蔽的栖息条件，才能生存和繁殖。因此，创造一个不适宜其生存的环境，就能使一个地方的鼠量大大下降，并能使灭鼠成果容易得到巩固。所以我公司首先建议搞好环境卫生、清除住宅周围的杂草、随意堆放的物品，经常清扫室内外卫生，各种用具杂物收拾整齐，衣箱、衣柜以及书籍、鞋帽等要经常检查，不使鼠类营巢；断绝老鼠的食物：鼠的食物不仅包括人的食物，还包括饲料、垃圾、食品行业的下脚料、粪便等，这些东西要存放在加盖的而且没有缝隙的容器内，使老鼠得不到食物而被动地去吃投放的毒饵，以达到消灭老鼠的目的。2、物理学灭鼠法：又称器械灭鼠法，应用较久，应用方式也较多。它不仅包括各种专用捕鼠器，如鼠夹、鼠笼，也包括压、卡、关、夹、翻、灌、挖、粘和枪击等。物理学灭鼠也讲究一定的科学技术，如安放鼠笼（夹）要放在鼠洞口，应与鼠洞有一定距离，有时用些伪装，可以提高捕杀率；鼠笼上的诱饵要新鲜，应是鼠类爱吃的食物。一般第一个晚上老鼠不易上笼因有“新物反应”，二、三天后上笼率会提高。3、化学灭鼠法：又称药物灭鼠法，是应用最广、效果最好的一种灭鼠方法。药物灭鼠又可分为肠毒物灭鼠和熏蒸灭鼠。作为灭鼠所用的肠道灭鼠药，主要是有机化合物，其次是无机化合物和野生植物及其提取物。胃肠道灭鼠药要求对鼠有较好的适口性，不会拒食，毒力适当。由它为主制成各种毒饵，效果好，用法简便，用量大。其次是毒水、毒粉、毒胶、毒沫等。熏蒸灭鼠，如磷化铝、氯化苦可用于仓库、轮船熏蒸灭鼠。4、生物学灭鼠法：包括两个方面：一是利用天敌灭鼠，鼠类的天敌很多，主要是食肉目的小兽如黄鼬、野猫、家猫、狐等，鸟类中的猛禽如鹰、猫头鹰等，还有蛇类。因此我公司建议对灭鼠区域保护这些鼠类天敌，对减少鼠害是有利的。5、生态学灭鼠：也就是通过改良环境，包括防鼠建筑、断绝鼠粮、农田改造、搞好室内外环境卫生、清除鼠类隐蔽处所等，也就是控制、改造、破坏有利于鼠类生存的生活环境和条件，使鼠类不能在那些地方生存和繁衍。生态学灭鼠是综合鼠害防治中很重要的一环。二、灭鼠药物

根据灭鼠药进入鼠体后作用快慢，分为急、慢性两类。1、急性灭鼠药，又称急性单剂量灭鼠药，鼠类一次吃够致死量的毒饵就可致死。这类药的优点是作用快、粮食消耗少，但它们对人畜不安全，容易引起二次中毒，同时在灭鼠过程中老鼠死之前反映较激烈易引起其它鼠的警觉，故灭效不及慢性鼠药。这类药有磷化锌、氟乙酰胺、毒鼠磷、毒鼠强溴代毒鼠磷、溴甲灵、敌溴灵等。氟乙酰胺和毒鼠强、甘氟由于毒性强，无特效解毒剂，很容易引起人、畜中毒，国家已明令禁用。2、慢性灭鼠药，又称缓效灭鼠药，可分第一代、第二代抗凝血灭鼠剂。第一代抗凝血灭鼠剂如敌鼠钠盐、杀鼠灵、杀鼠迷（立克命）杀鼠酮、氯敌鼠等，如要达到理想灭鼠效果就要连续几天投药。第二代抗凝血灭鼠剂的急性毒力相对较强，老鼠吃二次、三次就可致死小，且对第一代灭鼠药有抗性鼠也能杀灭。这类药有溴敌隆、大隆、杀它仗、硫敌隆等。三、死鼠处理：1、将死鼠整理装袋，送到空旷的地方挖沟用汽油焚烧，并掩埋。2、将死鼠运到空旷的草坪，挖50cm的深沟，投入石灰粉消毒，并进行掩埋。3、将死鼠可用0.05%过氧乙酸或含有效氯1000mg/l溶液喷淋消毒，用塑料袋密封好，送环卫部门进行无害化处理。处理完死鼠后要用消毒液消毒可能被鼠污染的场所并洗手消毒。四、注意事项

- 1、在灭鼠过程中，禁止使用急性药物，否则会引起老鼠警觉，以致拒食药饵。
- 2、老鼠有磨牙的习性，喜欢取食有壳饵料，取食时，反吃米粒而吐出谷壳，故也经常咬坏电话线、网线等。老鼠
- 3、施工人员能根据现场判断鼠踪鼠路，将药物投放老鼠出没的必经之地。<br>
- 4、小家鼠食量小、多疑、以致单纯用药饵不能彻底将之灭绝，必须辅以鼠笼、粘鼠胶等物理防治方法。
- 5、灭鼠毒饵一定要新鲜，投药方法要标准，地点要准确且隐蔽，以确保老鼠能摄食，才能投药有效灭治。
- 6、灭鼠毒饵投放要做到“三率”，即覆盖率100%、到位率100%、保留率100%，统一时间集中行动，在同一地区同时投放灭鼠毒饵是一种行之有效的灭鼠方法。
- 7、放毒饵应考到南方雨水多，尽量避免鼠药淋雨。（长期湿气大的地方如沙井内可投放腊块饵料），投药前清理失效的旧毒饵，保持毒饵的新鲜有效。
- 8、万一人畜中毒，可用维生素k1药物解毒。