

番茄青枯病发病表现 有机农药青枯立克杀菌剂

产品名称	番茄青枯病发病表现 有机农药青枯立克杀菌剂
公司名称	潍坊依一生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交叉口青辰国际B座811（注册地址）
联系电话	13011675299

产品详情

最近收到不少种植业者咨询番茄青枯病的问题，此小编专门为大家整理了一下番茄青枯病的表现及防治。

番茄青枯病一般在番茄结果中后期容易表现出来，传染性强、容易造成番茄的成片死亡，造成番茄大量减产甚至是绝收

发病时的表现：番茄全株萎蔫，最初会导致番茄顶端的叶片萎蔫下垂，番茄下部的叶片渐渐凋萎。在番茄青枯病发病初期，番茄病株会在白天萎蔫，晚上复原，病叶的症状明显变化。注意：青枯病的叶片萎蔫是由上到下最后是中部的。

怎么样辨别呢？

- 1、果、茎、叶部位没有明显的的病斑，植株死后仍然是青绿色。
- 2、白天萎蔫、晚上复原。叶片萎蔫的规律为由上到下最后是中部。
- 3、茎表皮粗糙，茎中下部增生不定根或不定芽，湿度大时，病茎上见初为水浸状褐色的斑

4、根部，特别是一些小的侧根变褐腐败而消失，切开近地表处基部，可以看到维管束变成褐色，用手指挤压，则从导管分泌出乳浊的粘液。

综合防治：选用抗病无菌种苗、实行轮作、增施有机肥等是防控番茄青枯病的必要措施，土壤湿度是影响番茄青枯病发病重要因素，雨季做好排水、确保土壤通透性，防控时期遇旱尽量避免大水漫灌，可以选择叶片喷施或小范围穴灌方式解决植株生长所需水分问题，一旦大水漫灌病菌随水传播、病情快

速发展或复发。

药物防治：

预防方案：

1、定植前：使用青枯立克100-150倍液进行蘸根。

2、缓苗期、苗期

使用青枯立克150-300倍+地力旺300-500倍+沃丰素600倍灌根1-2次，也可同时喷雾。

3、花果期

使用青枯立克150-300倍+沃丰素600倍喷雾2-6次，也可同时灌根；病害高发期同时复配大蒜油1000倍或其它化学药。

备注：如需浇水，请于浇水前1-2天喷雾用药

控制方案：

发现病情后，用青枯立克90-150倍+大蒜油1000-1500倍进行喷雾+灌根，连用2-3次，间隔2-3天（喷雾需要1天喷1次，连续喷雾3天）；病情严重的可复配其它化学药。