

番茄溃疡病发病条件 青枯立克灌根效果好

产品名称	番茄溃疡病发病条件 青枯立克灌根效果好
公司名称	潍坊依一生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交叉口青辰国际B座811（注册地址）
联系电话	13011675299

产品详情

番茄溃疡病多为成株染病，发病初期植株下部叶片向上纵卷，凋萎下垂，部分植株出现萎蔫，后期病叶叶缘枯黄，叶脉间变黄，全叶变褐枯萎，但不脱落。茎部受害，生狭长条斑，扩展迅速，后期病斑开裂，茎干增粗，产生大量气生根，髓部中空腐烂，有臭味散出，严重时植株枯死。

1、番茄溃疡病发病条件

感染植株或果实时主要是通过伤口侵入，也可从气孔或果实表面直接侵入。而在番茄生长期內，温暖潮湿，多阴雨天气或长时间结露有利于发病，发病后偏施氮肥或大水漫灌，都会导致病害蔓延病菌最适宜的生育温度在25--27℃，生长温度范围为1--33℃，高温高湿连作排水不良利益该病流行。

2、番茄溃疡病生物防治

定植前蘸根:青枯立克150倍+地力旺300倍+沃丰素600倍进行蘸根。进行保护，防治发病，配合生物菌肥一块使用。

缓苗期：青枯立克150倍+地力旺300倍+沃丰素600倍灌根1次，喷雾2次（间隔3-5天）。现蕾期，开花前：青枯立克150倍+地力旺300倍+沃丰素600倍灌根1次，喷雾1次（注意不要喷洒开放的花朵跟生长点）。

上病后，青枯立克100-150ml+大蒜油15ml+沃丰素25ml+有机硅兑水30斤连续喷、灌3-4次，一天1次，病情严重的可复配1次化学杀菌剂。

以上措施全面贯彻执行，不但能有效的防止番茄的各种细菌性病害，而且还能提高番茄的

植株抵抗各种恶劣环境的能力，促进根系发达，叶片厚实发亮，长势健壮。番茄果实品质提高，
口感纯美。