

# 大金星山楂苗图片 大金星山楂苗种植管理

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 大金星山楂苗图片 大金星山楂苗种植管理                |
| 公司名称 | 泰安市果之语农业科技有限公司                     |
| 价格   | 4.00/棵                             |
| 规格参数 | 品牌:果之语农业<br>大五楞山楂:甜红籽山楂<br>产地:山东泰安 |
| 公司地址 | 泰安市高新区北集坡镇                         |
| 联系电话 | 18364868333                        |

## 产品详情

大金星山楂苗图片 大金星山楂苗种植管理 求购山楂苗就去果之语农业山楂苗基地，山楂苗品种全，质量优，服务好，是您购买山楂苗的基地。山楂苗零售价格8元/棵，山楂苗价格/山楂苗格：5元/棵，根据山楂苗订购数量和规格的不同，山楂苗格有所差异。望新老客户来电。联系人：宋经理

购买山楂苗免费提供种植技术 山楂苗种植技术：一、土肥水1.1土壤土壤深翻熟化是产技术中的基本措施，进行深翻熟化，可以改良土壤，加土壤的通透性，促进树体生长。1.2施肥施基肥,未果后及时施基肥，以补充树体营养，基肥以有机肥为主，每亩开沟施有机肥3000--4000千克，加施尿素20千克，过钙50千克，草木灰500千克。追肥，一般1年追3次肥,在3月中旬树液开始流动时，每株追施尿素0.50--1千克，以补充树体生长所需的营养，为坐果率打好基础。谢花后每株施尿素0.50千克，以坐果率。7月末花芽分化前每株施尿素0.50千克，过钙1.50千克，草木灰5千克，以促进果实生长，果实品质。1.3浇水一般1年浇4次水，春季有浇水条件的在追肥后浇1次水，以促进肥料的吸收利用。花后结合追肥浇水，以坐果率。在麦收后浇1次水，以促进花芽分化及果实的快速生长。浇封冻水，冬季及时浇封冻水，以利树体越冬。二、修剪2.1冬季修剪2.1.1防止内膛光秃，由於山楂树易分枝,常使都闭，内膛小枝生长弱，枯死枝逐年多，各级大枝的中下部逐渐裸秃。防止内膛光秃的措施应采用疏、缩、截相结合的原则，进行改造和更新复壮，疏去轮生骨干枝和密生大枝及竞争枝、徒长枝、病虫枝，缩剪衰弱的主侧枝，选留适当部位的芽进行小更新，健壮枝组。对弱枝重截复壮和在光秃部位芽上刻伤枝的进行改造。2.1.2少短截山楂树结果期后，凡生长充实的新梢，其顶芽及其以下的1--4芽，均可分化为花芽，所以在山楂修剪中应少用短截的，以保护花芽。2.1.3复势山楂树结果期后，多年连续结果，枝条下垂,生长势逐渐减弱，骨干枝出现焦梢，产量下降。要及时进行枝条更新，以恢复树势。对於多年连续结果的枝或其他冗长枝、下垂枝、焦梢枝、多年生徒长枝，回缩到后部的分杈处，并利用背上枝带头，以强生长势，促进产量的。2.2夏季修剪2.2.1疏枝山楂抽生新梢能力较强，一般枝条顶端的2--3个侧芽均能抽生强枝，每年树冠分生很多枝条，使树冠郁闭，通风透光不良，应及早疏除位置不当及过旺的发育枝。对花序下部侧芽萌发的枝一律去除，克服各级大枝的中下部裸秃，防止结果部位外移。2.2.2拉枝夏季对生长旺而有空间的枝在7月下旬新梢停止生长后，将枝拉平,缓势促进成花，加产量。2.2.3摘心5月上中旬、当树冠内心膛枝长到30--40厘米时，留20--30厘米摘心，促进花芽形成,紧凑的结果枝组。2.2.4环剥一般在辅养枝上进行，环剥宽度为被剥枝条粗度的1/10。3病虫害山楂虫害主要有红、桃小食心虫、桃蛀螟，病害有轮纹病、病。三、病虫害3.1红和桃蛀螟在5月上旬至6月上旬，喷布2500倍。3.2桃小食心虫在6月中旬树盘喷100--150倍乳油，杀死越冬代食心虫幼虫，7月初和8月上中旬，树上喷布1500倍乳油，

消灭食心虫的卵及初入果的幼虫。3.3轮纹病在谢花后1周喷80%多菌灵800倍液，以后在6月中旬、7月下旬、8月上中旬各喷1次剂。3.4对病发病较重的山楂园在发芽前喷1次50%石硫合剂，期、6月份各喷1次600倍50%可湿性多菌灵或50%可湿性托布津。泰信园艺场常年专业从事山楂苗、山楂树苗的培育，所培育山楂苗、山楂树苗量大质优，深受广大客户喜爱，销往各省市深受用户好评。公司产品自产自销、品种纯度、信誉为重、的宗旨服务广大客户，并为广大客户的需求检疫，运输，并常年办理保湿邮寄业务，以“努力汗水”换取您的信任满意，欢迎广大新老客户来电垂询！