

10公分柿子树批发、10公分柿子树现货

产品名称	10公分柿子树批发、10公分柿子树现货
公司名称	泰安市果之语农业科技有限公司
价格	4.00/棵
规格参数	品牌:果之语农业 品种:柿子树苗 产地:山东泰安
公司地址	泰安市高新区北集坡镇
联系电话	18364868333

产品详情

10公分柿子树批发、10公分柿子树现货 果之语农业终年专业处置果树苗、绿化苗的培养，所培养果树苗、绿化苗量大质优，深受恢弘客户喜欢，销往各省市深受用户好评。公司产物自产自销、种类纯度、诺言为重、的主旨客户，并为恢弘客户的需求包揽苗木检疫证实，运输，并终年保密封湿邮寄业务，以“积极汗水”调换您的信赖，接待新老客户来电垂询！【运输】：汽车运输、物流配车、空运、快递、快运等。 柿子树苗病虫害：1、柿子苗柿疯病症状：病树秋季抽芽晚，发展，叶脉玄色、枝干木质部变成黑褐色，严峻的扩及韧皮构造，致枝条丛生或竖立徒长或枝枯、梢焦，效果少，且果实提早后脱降，严峻的不后果或整株枯死。：（1）选用抗病种类或哄骗抗病砧木育种。（2）增强，抗病力。

（3）选用健树作砧木，嫁接无病接穗。（4）须要时可向树体注入四环素类素。2、柿子苗柿角病症状：首要为害叶片和果蒂，初病发时，叶子正面呈现黄绿色至浅褐色不规矩形病，当前病渐渐加深，边沿由不较着至较着，后构成深褐色边沿的多角形病，巨细2~8毫米，上具小黑粒面。柿蒂抱病多产生蒂四周，褐色啣深褐色，边沿或不显明，由蒂尖向内扩大，病发重的降叶和降果。：

（1）降叶后至翌年新叶抽生前，摘除树上残余的病蒂，病源。（2）6~7月喷1:5:400~600倍波尔多液二次，别的也可选用70%代森锰锌干悬500倍液或64%杀毒矾可湿性粉剂500倍液。

（3）施有机肥，抗病力。3、柿子苗柿病症状：首要为害新梢和果实，偶然也侵染叶片。新梢抱病，多产生5月下旬至6月上旬，初于外貌圆形小面，后变暗褐色，病扩大呈长卵形，中部稍凹陷并现褐色纵裂，其上发生小粒面，即病菌分生孢子盘。气候时玄色病上赤色粘状物，即孢子团。病长10~20毫米，其下部木质部腐败，病梢极易折中断。当枝条上病大时，病以上枝条易枯死。果实抱病，多发作6月下旬至7月上旬，也可持续到采收期。果实抱病，初正在果面发生针头巨细深褐色至玄色小面，后扩大为圆形或卵形，稍凹陷，呈黄褐色，直径5~25微米。密生灰色至玄色轮纹状摆列的小粒面，遇雨或高湿时，溢精彩粘状。病常深切皮层以下，果内构成硬块，一个病果上普通生1~2个病，多者数十个，常晚期脱降。叶片抱病，多产生于叶柄和叶脉，初黄褐色，后变成黑褐色至玄色，长条状或不划定规矩形。：

（1）增强，特别是肥、水，防备徒长枝发生。

（2）初侵染源。连系冬剪剪除病枝，柿树发展期认真剪除病枝、病果，天果，会合或深埋。（3）选栽无病苗木。引进苗木时，认真查抄，发明病苗实时汰除，并用1:3:80倍波尔多液或20%石灰乳浸苗10分钟，然后定植。（4）抽芽前喷洒波美5度石硫合剂或45%晶体石硫合剂30倍液，6月上、中旬各喷一次1:5:400倍波尔多液，7月中旬及8月上、中旬各喷一次1:3:300倍波尔多液或70%代森锰锌可湿性粉剂400~500倍液、50%苯菌灵可湿性粉剂1500倍液、70%硫菌灵可湿性粉剂1000倍液。4、柿子苗柿圆病症状：柿圆病

为常病发，形成叶，柿果提早变红、首要为害叶片、也能为害柿蒂。叶片抱病，初生圆形小面，叶面浅褐色，边沿不显明，后病转为深褐色，中部稍浅，边沿，病叶正在变红的中，病四周现出黄绿色晕环，病直径1~7毫米，普通2~3毫米，前期病上长出玄色小粒面，严峻者仅7~8天病叶即变红脱降，留下柿果。后柿果亦逐步转红、，大量脱降。柿蒂抱病，病圆形褐色，病小，病发较叶片晚。：

(1) 干净柿园，秋终冬初及柿园的大量降叶，集合深埋或销毁，以初侵染源。

(2) 增强。施基肥，干旱柿园实时。(3) 实时喷药防备。一样平常6月上中旬，柿树降花后，子囊孢子大量飞散前喷洒1:5:500波尔多液或70%代森锰锌可湿性粉剂500倍液、64%杀毒矾可湿性粉剂500倍液、36%硫菌灵悬浮剂400倍液、65%代森锌可湿性粉剂500倍、50%多菌灵可湿性粉剂600~800倍液。若是子囊孢子的飞散期间喷1次药便可，但正在区第1次药后隔半个月再喷1次，则结果更好。5、柿子苗柿黑星病症状：重要为害叶、果和枝梢。叶片抱病，初正在叶脉上生玄色小面，后沿脉舒展，扩大为多角或不定形，病乌黑色，四周色暗，中部灰色，湿度大时后背现出玄色霉层，即病菌分孢子盘。枝梢抱病，初生浓褐色，后扩大成仿锤形或卵形，略凹陷，严峻的自此开裂呈溃疡状或折中断。果实抱病，病圆形或不法则形，稍软化呈痂状，也可正在病处裂开，病果易脱降。：

(1) 干净柿园，秋终冬初实时柿园的大量降叶，集合深埋或销毁，以初侵染源。

(2) 增强。施基肥，干旱柿园实时。(3) 实时喷药防备。普通6月上中旬，柿树降花后，子囊孢子大量飞散前喷洒1:5:500波尔多液或70%代森锰锌可湿性粉剂500倍液、64%杀毒矾可湿性粉剂500倍液、36%硫菌灵悬浮剂400倍液、65%代森锌可湿性粉剂500倍、50%多菌灵可湿性粉剂600~800倍液。6、柿子苗柿病症状：此病首要叶子，惹起叶，偶然也风险新梢和果实。病发(5-6月)，正在叶面上泛起的针尖巨细的小斑点，病直径1-2厘米，今后至齐叶。：

(1) 赶早叶，会合。

(2) 冬季深翻果园，将子囊壳埋入土中。

(3) 4月下旬至5月上旬喷0.2度石流合剂，杀死抽芽的孢子，防备侵染。

(4) 6月中旬正在叶背喷62.25%仙生可湿性粉剂600倍或1 3-5 600倍波尔多液，菌丝伸张。