

# 波姬红无花果树苗批发、波姬红无花果树苗技术指导

产品名称	波姬红无花果树苗批发、波姬红无花果树苗技术指导
公司名称	泰安市果之语农业科技有限公司
价格	4.00/个
规格参数	公司:果之语农业 品种:无花果树苗 产地:山东泰安
公司地址	泰安市高新区北集坡镇
联系电话	18364868333

## 产品详情

波姬红无花果树苗批发、波姬红无花果树苗手艺 无花果苗就去果之语农业无花果苗基天，无花果苗种类，质量优，效劳好，是您购无花果苗的基天。无花果苗零代价5元/棵，无花果苗代价/无花果苗价钱：4元/棵，按照无花果苗数目和规格的差别，无花果苗价钱有所差别。望新老客户来电征询。

购无花果苗免费栽种 培养无花果树种类— 1青皮无花果树：树势茂盛，骨干。叶掌状3-5浅裂。果实扁，倒圆锥形。果实成熟前绿色，熟后黄绿色、果肉紫赤色，果目小，开张。夏果均匀单果重80-100克，秋果均匀单果重40-50克。果面光滑不开裂，果皮韧度较大，成熟果含糖量正在20%摆布，品格，丰登、较抗寒、属晚熟种类。 2、布兰瑞克无花果树：树势中庸，骨干不显着，多丛生；叶掌状5-7深裂，裂片窄条形。果实熟前黄绿色，熟后黄褐色，果肉虎魄色到浓粉赤色。果形不整，长卵圆形斜偏一方，果目开张，果皮薄，不开裂。夏果均匀单果重100-120克，数目，秋果单果重30-40克，极丰登。成熟果含糖量达18-20%，品格上佳，中晚熟种类。 3、紫陶芬无花果树 首要夏果的早熟种。树势中强，树姿半开张。叶为形，5裂。叶色绿，叶背茸毛稍多。夏果大，短卵圆形，重110~150克，大果重252克。果面紫色，果肉桃白色，肉质厚，柔嫩致密，味甜，有香味，品格较好。6月下旬至7月上旬成熟，丰登。也可采收秋果，球形或扁球形，品格优。扦插苗昔时见果。需求授粉。得当。 4、新疆早黄无花果树 新疆南部阿图什特有早熟无花果种类。夏秋果兼用种类，秋果扁圆形，单果重50-70克，果熟时，果顶不开裂，果肉草莓色，可溶性固形物含量15% - 17%或更高，风味浓甜，品格上。树势旺，但树姿开张，萌枝率高，枝细弱，尤以夏梢更衰，正在原产天新疆阿图什，夏果熟期&Ov0a\*K:b&~生果邦爱果者论坛7月上旬，秋果8月中下旬成熟。该种类果中等大，品格佳，丰登性强，为鲜食用精良。但正在江苏、南京、河南许昌、新乡等天引种，体现徒长、成绩少、成熟期推延，是以，本地引种必需徒长等配套种植，以包管果实产量和品格。 5、布兰瑞克(BrownsWick)无花果树 原产法国，夏秋果兼用种类。树势中庸。叶片5裂，裂片窄条形。果较大，斜倒圆锥形，果梗基部常有膨大，果皮古黄铜色。果肉浓粉赤色，含糖量16-17%，风味苦涩，品格上等。夏果采收期7月中旬，秋果采收期8月中旬至10月中旬。果较耐贮，相宜制罐和蜜饯。树性耐寒耐盐，现在华东一带有栽种。可正在华东、华南及内地滩涂开展。 6、金傲芬无花果树 树势旺，枝条细弱，分枝少，年发展量2.3-2.9米，树皮灰褐色，滑腻。叶片较大，掌状5裂，裂刻深12-15厘米，叶缘具微波状锯齿，有叶锯，叶色浓绿，叶脉掌状，5基出，叶柄长14-15厘米。夏、秋果兼用种类，以秋果为主。始果节位1-3节，果实个大，卵圆形，果颈明明，果柄0.9-1.8厘米，果径6-7厘米，果形指数0.95，果目微开，不敷0.5厘米，果皮金，有光芒，似涂蜡质。果肉浓，致密，单果重70-110克，大160克

，可溶性固形物18%-20%。鲜食风味、品格上，极丰登，较耐寒。扦插昔时，2年生单株高产量达9公斤以上。正在山东省嘉祥县，3月18日至4月12日抽芽，3月26日至4月16日展叶并起头新梢发展，11月初降叶，夏果现果期3月21至4月14日。成熟期7月18日，发育期约64天。秋果6月1日现果，8月上旬成熟，发育期62天。果熟期7月下旬至10月下旬，前提时可耽误至12月份。该种类为鲜食佳种类，也可用于。

7、波姬红无花果树 树势中庸、强健，树姿开张，分枝力强，新梢年发展量可达2.5米，枝粗2.3厘米，节间长5.1厘米。叶片较大，多为掌状5裂，裂刻深而狭，叶径27厘米，基出脉5条，叶缘具有不划定规矩波状锯齿。叶柄长15厘米，黄绿色。耐寒、耐盐碱性较强。始果部位2-3节，极丰登。果实夏秋果兼用，以秋果为主，果长卵圆或长圆锥形，果形指数1.37厘米，皮色美丽，条状褐红或紫赤色。果肋较显明。果柄0.4-0.6厘米。果目开张径0.5厘米。秋果均匀单果重60-90克，大单果重110克。果肉微中空，浅红或赤色，味甜，汁多，可溶性固形物含量16%-20%，品格。为鲜食大型白色无花果优秀。山东省果熟期7月下旬至10月中下旬。

8、鲜食兼用优秀-青皮无花果树 鲜食物质均佳，耐寒、耐瘠薄、耐盐碱。树势茂盛，树冠圆长形，骨干，侧枝开张角度大，多年生枝灰红色。叶大粗拙，色深亮绿，背生茸毛，黄绿，掌状破裂，每每3-5浅裂，裂刻长度缺乏叶长的1/2，少齐缘，基部深心形，叶缘具显着的波状锯齿、圆钝，叶形指数1.12，叶柄均匀长10.32cm。果实扁、倒圆锥形，果形指数0.86阁下。果实熟前绿色，熟后黄绿色，果肉浓紫色，果目小，开张，果面腻滑不开裂，果肋显明，果皮韧度较大，果汁较多，含糖量高，夏秋两季果。该种类性广，南边旺长。

## 二、无花果树苗种植

无花果的重要建园定植、土肥水办理、整形修剪和幼树越冬掩护等内容。

- 1、建园和定植无花果种植的纬度限定是北纬40°以南，冬季气温低于-15 的天不宜建园。建园宜挑选背风朝阳的天，忌涝高地。建园前深翻整天，亩施土杂肥2000-3000千克。建园时应选良种壮苗，深坑浅栽，栽植工夫以3月尾至4月初为佳，胶东天可耽误4月中旬。栽植密度青皮无花果一样平常株距3-4米，行距4-5米；布兰瑞克无花果株距2-3米，行距4米。
- 2、土肥水治理可参照普通果园停止。基肥可选用厩肥、土杂肥和复合肥，而以鸡粪好。施用工夫是初春和秋后。追肥品种，发展施用磷酸二铵，忌用碳酸氢铵和尿素；发展宜施磷酸二氢钾。相对来讲，无花果较抗旱不耐涝，秋季和越冬前留意，发展应做好防涝排水事情。
- 3、整形修剪无花果树形培育种植提拔多骨干形。栽植年定干，定干高度40-60厘米。第二年枝条留30-40厘米举行短截，加分枝本领，掌握树高，保存4-7个主枝。今后对50厘米以上长枝停止摘心，节制旺长，或喷施矮化剂。同时疏除根蘖枝、过密枝和细弱枝。
- 4、幼树越冬回护栽植昔时，无花果幼树抗寒本领差，枝条抽干较重，应采纳。简洁易行的要领是骨干基部培土20-30厘米，枝条绑扎稻草绳。