

# 矮化红南阳樱桃苗种植指导

产品名称	矮化红南阳樱桃苗种植指导
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	20.00/棵
规格参数	
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

## 产品详情

泰安开发区忠信苗圃拥有20多年的育苗经验，集苗木科研、繁育、推广、批发销售于一体，采用与农户联营育苗的方式，年出圃20多万株樱桃苗。本基地郑重承诺：保证樱桃苗的成活率，每年都是无菌繁殖。我们提供的樱桃苗价格低，品种纯，深受各地客户的信赖。我们拥有专业的技术团队，定期亲临您的果园现场，传授大樱桃苗种植技术主要品种：罗亚理 罗亚明 美早 布鲁克斯 红灯 黄蜜 雷尼 红南阳 柯迪亚 齐早等

红南阳：在日本山形县东根市武田松男果园中发现的南阳品种的红色优良芽变系，而南阳是日本山形县园艺试验场从那翁的杂交实生苗中选育出来的。特征特性：红南阳，树势强健，生长旺盛，直立。萌芽率较高，成枝力较强，较丰产。幼龄树短果枝少，结果较晚，逐渐转以短果枝和花束状果枝结果为主，花芽多着生在中位，开花晚于那翁品种，花蕾期抗寒力弱，抗病虫能力较强，采摘期略早于那翁品种。果个特大，平均单果重12-13克。果实椭圆形，缝合线明显。果皮，阳面鲜红色，外观艳丽。果肉硬而多汁，含糖14-16%，含酸0.55-0.60%，风味醇美可口，品质极优。剪枝时要注意开张大枝角度，改善光照条件，促进花芽形成，增加果实着色度。

在3月和12月进行。适宜在土层深厚、质地疏松、通气排水良好的坡地建园，在平地上定植要起垄做畦，垄高30cm左右。选择优质壮苗，修剪根系并用600倍液多菌灵和适量生根粉的泥浆浸泡10~12分钟消毒杀菌，按挖穴、展根、扶正、踏实方法拉线定植，埋土深度与苗木根部原土痕相齐为宜，灌足定根水。栽培密度为2m×4m，每亩88株，因自花结实率高，可不必配置授粉树种。定植第1~2年，果园地面覆盖率较低，要进行扩穴改土、中耕除草、松土保水保墒。扩穴改土宜在秋季，可结合施基肥同时进行。中耕除草主要在春夏两季，可采用割草压青，增加园土有机质含量，可与松土保水保墒同时进行。定植第3年后，园地80%以上被枝叶覆盖，在秋施基肥时进行深翻扩穴即可。幼树在出芽时以氮肥为主，用0.5%的尿素连浇两次，间隔半月，再改为1%连续两次。成年树在花前株施以氮肥为主的复合肥0.1kg，在果实膨大期株施以钾肥为主的复合肥0.2kg，采果后株施以磷肥为主的复合肥0.3kg。生长期喷施4次叶肥，同时加入微量元素。开花坐果期间喷0.2%~0.3%硼砂溶液两次，提高坐果率。在秋季，结合深翻扩穴株施有机肥30kg左右。

水分雨季后要做好排水防涝，旱时可结合秋季施肥进行适当灌溉，重点是抓好萌芽前、硬核期、采后保叶时的土壤含水量，尤其在樱桃果实硬核期至第2次快速膨大期，要使10~30cm范围内的土壤含水量稳定在12%左右，以免影响果实膨大，防止裂果。

中国樱桃萌芽力和成枝力均强，可采用自然开心型和自由纺锤型树形。第1年定干高度为40cm，抹除剪口下第2~3个芽，促发分枝，秋后对大枝进行拉枝，基角 $60^{\circ}$ ~ $80^{\circ}$ 。第2年剪留主干60cm左右，秋天继续拉枝，培养主枝，将下部主枝及上面拉平的枝条甩放，待新梢长到20cm时摘心，促其转化为中果枝。第3年与第2年基本相同，注意疏除病枝、弱枝、过密枝，并及时对新梢进行摘心，以促生分枝和花芽形成。第4年以后主要做好摘心和对角度不好的主枝拉枝，控制旺长，促进花芽形成。总体目标是将其高度控制在2m以内，主枝15~20个，呈3层分布，开张角度 $60^{\circ}$ ~ $80^{\circ}$ ，交错排列。通过花期放蜂或喷施土壤微肥（0.2%磷酸二氢钾与0.2%硼砂交替使用）可有效提高坐果率。疏除晚花、弱花，一般一个短果枝保留花束3~4个，单个花束留果不超过5枚。2月下旬到3月上旬，在长江中下游地区经常遇到阴雨天，对樱桃坐果影响很大，建议有条件的地方进行避雨栽培，在果实成熟时可适当减轻裂果、防止鸟害。另外，可通过大棚设施进行促成栽培，也可用遮阳网覆盖进行延迟栽培。结合冬季修剪，剪除枯枝、病枝，并带出烧毁。越冬前喷石硫合剂杀除病原菌。花后用800倍液氧化乐果防治桃瘤蚜、大灰象甲等多种害虫。生长期间用1500倍液氯氢菊酯或1200倍液毒死蜱防治绿盲蝽、黄尾毒蛾、梨小食心虫、刺蛾类、金龟子类等害虫。展叶后用800倍液甲基托布津防治细菌性穿孔病、褐斑病、褐腐病等。