

## 1.5公分香椿树苗什么时候栽 2公分大棚香椿苗出芽率高

产品名称	1.5公分香椿树苗什么时候栽 2公分大棚香椿苗出芽率高
公司名称	泰安神牛农业科技有限公司
价格	1.00/棵
规格参数	
公司地址	山东泰安高新区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13562807700

### 产品详情

定植：在苗圃培育1-2年的香椿苗木，于秋季11月中下旬落叶后入棚，每平方米栽12-15株。挖深40厘米，宽40厘米的栽培沟，填入有机肥和化肥作基肥，填一层土，放入苗木，使根接近自然状态地舒展分布于坑内；再填一层土，捏住茎秆轻轻上提，然后加土到原土以上5厘米左右，踏实、浇水。移苗栽种大棚还应注意适当遮荫，防止幼苗脱水萎焉。

### 二、田间管理

1、整枝：香椿主茎长到50-60厘米高时，除去主茎生长点，以促进侧枝发育。侧枝长到20-25厘米时，采收嫩芽。无论是主茎打尖还是侧枝采收，都应注意不伤植株其它部位。第二年香椿主茎直径达到1-2米时，下部根繁殖出幼苗应及时铲断其侧根，以促新根生长，防止老根、锁根老化而丧失吸收能力。

2、肥水管理：氮磷钾科学配合，保持田间耕层水分捏之成团，触之能散为宜。香椿成株后，仍然需经常浇水施肥，特别是6月中旬香椿进入速生期，要加强肥水管理。每次采收前后亩施复合肥15千克。

3、覆盖：保护地密植栽培在11月中旬扣棚膜，保持棚温16℃左右。一般40-50天即可打破休眠，顶芽开始萌动，12月要严盖薄膜，棚内温度控制在白天15-30℃，夜间10-18℃，阴雪天棚内夜间加盖塑料薄膜。

4、病虫害防治：主要害虫有红蜘蛛、绿刺蛾、造桥虫、毒蛾和铜绿金龟甲。农业防治：防治害虫要早，必须在点片危害阶段抓紧进行，以避免影响产量（尤其是春季产量）和质量。化学防治：对红蜘蛛用20%螨克乳油3000倍液，5%卡死克乳油1500倍液喷雾；对绿刺蛾、造桥虫、毒蛾用48%乐斯本乳油800倍液，20%米满1500倍液，1%杀虫素1000倍液喷雾。

