

## 红西梅李子苗单价多少钱 红西梅李子苗2019年报价

产品名称	红西梅李子苗单价多少钱 红西梅李子苗2019年报价
公司名称	泰安高新区北集坡凯欣园艺场
价格	8.00/棵
规格参数	厂家:泰安凯欣园艺场 地径:0.6cm 纯度:98%
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡街道办事处
联系电话	13583899905

### 产品详情

泰安开发区凯欣园艺场介绍红西梅李红喜梅引种地：红喜梅是德国引进的欧洲李经多年培育而成的新西梅品种。经过多年观察该品种具有6大优势：

- 1、果型奇特：果实长卵形，平均单果重75g，大果120g。
- 2、色泽艳丽：果面玫瑰红，果面光洁，着色均匀，商品率高，克服了多数李品种果面因发生霜冻、枝摩或叶摩引起的果面着色不匀形成的褐斑现象。
- 3、品质极优：味极甜，有香气，品质极佳，可溶性固形物含量18.5%，高23%。可食率96.7%。克服了多数李品种果皮涩酸的缺点。
- 4、抗逆性强，耐粗放式管理：果实8月中旬成熟。自花结实率极高。不需配置授粉树，花期较普通李子品种晚5-7天。可避免晚霜危害，易管理，丰产稳产，果梗着果力强，抗风性能好，成熟前遇雨不裂果，采前不落果。
- 5、果皮厚，肉质韧，离核，成熟后在树上可挂果20天左右，果肉不变软；耐运贮，一般冷藏条件下可贮藏90天，室内常温下可贮藏2-3周。
- 6、经济效益高：盛果期亩产2500公斤以上，超市售价20-30元/公斤，效益高。

三、整形修剪。布朗李树形宜选用自然开心形，主干高度50—60厘米，主枝3—4个，主枝基角40°左右，无中心杆。盛果期以前的幼树，修剪以疏除过密枝，竞争枝及轻剪长放为主，通过撑、拉、压等措施将主枝角度开张到60°左右，辅养枝及直立枝角度开张至60—70°，以促发短枝结果。对旺长树，可在3

月上、中旬每平方米树冠投影土施15%多效唑2克控长促花。盛花期修剪是保持良好的主从关系，调整好生长和结果的矛盾。修剪时要利用骨干枝换头的方法控制树体的大小，调整先端角度维持树势。树冠上部及外围枝疏放结合，即疏密留稀、去旺留壮，保留枝长放不截，这样才能促使形成量多质高的花束壮果枝，缓和上部及外围枝长势，改善内膛光照。对枝组采取疏弱留强，去老留新，分期分批回缩复壮。夏季应加强修剪护理，包括萌芽期抹除方向不正或双芽中的弱芽；花后疏除过密枝、竞争枝、徒长枝，以利保持良好的光照条件；果实硬核后对旺枝要短截促发二次枝及对长果枝要及时摘心促花。

四、病虫害防治。病虫害防治要全面贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，以利改善果园生态条件，种植后要加强栽培管理为基础，要利用农业和生态环境调控措施，利用天敌发挥自然控制作用。具体做法是：一是要全面进行果实套袋：果实套袋在花后30—40天进行，即4月10日一月底完成。纸袋应选择质量好的单、双层袋。套袋前喷1次杀菌剂和除虫剂。采果前1—2周摘除套袋，促使果实充分转色，提高品味。二是灯诱杀蛾：在果实生长发育阶段，利用虫蛾的趋光、趋化特性，在果园安装诱虫灯，并在灯下放盛有少量糖醋液和柴油的盆，可诱杀大量蛾子。三是农药防治：药剂主要选用生物制剂和高效低毒低残留农药，杀菌剂主要选用石硫合剂、波尔多液、甲基托布津、多菌灵、代森锰锌等。杀虫杀螨剂主要选用一遍净、吡虫啉、阿维菌素、鱼藤精等。各种农药(除波尔多液)每年只能使用一次，采果前20天禁止使用任何农药。

五、疏花疏果。布朗李如遇气候和管理不佳的情况，坐果率较低，会出现满树花半树果现象。其主要原因是李开花坐果均靠花束状果枝，开花时由于枝的顶端优势较强，如果不控制枝梢的生长，花序上的花、幼果常会因养分不足或种胚发育不健全，形成子房膨大受阻，在花后2—3周造成大量的生理落果。提高坐果率的技术措施主要有：花期果园放蜂，改善授粉，每2—3亩投放一箱蜜蜂。花期采取剪截细弱花枝的方法疏花，花后15天疏果，花后25天定果，全部留单果，果间距10—15厘米。