

中农红无花果苗价格 中农红无花果苗品种介绍

产品名称	中农红无花果苗价格 中农红无花果苗品种介绍
公司名称	泰安高新区北集坡凯欣园艺场
价格	6.00/株
规格参数	纯度:98% 地径:1cm 包装:保湿邮寄
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡街道办事处
联系电话	13583899905

产品详情

泰安高新区凯欣园艺场介绍介绍中农红树势中庸，分枝较少，树冠较开张，新梢年生长量1.3~2.3米，为夏秋果兼用品种。果实长卵圆形，果形指数1.16。始果节位1~5节。夏果单果重90克，秋果单果重45~60克。果肉红色、汁多、味甜，可溶性固形物含量18%~22%，品质极佳。该品种丰产性能特别强，较耐寒，果实个大，产量高，果目小，不易被昆虫取食，具一定抗病能力，是鲜食和加工制干良种。

大树形地栽无花果可待主干长待1.5米时摘去顶尖。从地面起留50厘米留3-4根枝条作主枝，3层枝条的伸展方向要避免重叠影响光照。

二、主要修剪技术

短截剪去1年生枝一部分的修剪方法称短截。短截可促进在适当部位抽生分枝，促进新梢的长势，增加分枝的生长长度，加强营养生长，有利于形成理想树形。无花果栽植当年按定干高度短截定干，促进主枝分生。为了整形的需要，以后每年对主枝上的延长枝都可短截，促发分枝，丰满树形，对于部位合理的长枝可在适量疏枝的基础上轻短截，以培养结果枝组。

疏枝可以改善冠内通风透光条件，减轻和缓和先端的极性优势，减少营养的无为消耗，集中养分促进花序分化和果实发育。疏枝对象为背上旺枝、过密侧枝、细弱枝和徒长枝。无花果幼树整形期间宜少疏，盛果期对于必须疏除的大枝，锯除时伤面要修光，并涂抹伤口保护剂，以利于伤口及早愈合。同时，一年内一次不宜疏除过多，以免削弱树势。

回缩修剪主要在弱树弱枝上应用，通过回缩，减少枝条外围或先端的枝芽量，引光照深入内膛，改善树冠光照条件，对留下来的枝芽生长和开花坐果有促进作用。这种促进作用随缩剪量大小、回缩程度

和枝条强弱不同而异。缩剪量大、回缩程度重，促进作用也大；反之，促进作用则小。回缩多用于无花果主干枝、结果枝组的培养和更新。

夏剪：无果树修剪后有利于增产，但应注意，只进行冬季修剪，还不能取得大的增产效果。无花果的枝条长势旺，在年生长周期中不断生长。如不夏剪，枝条生长消耗营养过多，影响二次结果。分枝力弱的品种，以收秋果为主的品种，更应注意夏季修剪。

无果树是在当年生新梢上结果，除秋末在新梢顶部的叶腋内、分化花托原始体，第2年继续分化并开花形成春果外，新梢生长的同时，由新梢基部向上还能依次形成花托结果，长成夏果和秋果。这是无果树能丰产的原因，因此，修剪无花果。处理枝条时应慎重短截，尽量少短截。

为使旺长新梢生长充实，可在5月中旬前后，对新梢留30cm长，进行摘心，促生二次枝并促使形成花芽。对已达到预定长度的新梢，需及时摘心，不要使其继续延伸，以利枝条下部结的果实早熟和二次果成熟，摘心的时间、数量及果实的留量均须适度，既要有利当年结果，还要有利来年树的生长和结果。

摘心 摘心能抑制新梢生长，减少枝条长度，促进萌芽分枝，增加大枝或骨干枝基部的分枝。因此新梢旺长时期摘心可促生二次枝，有利于扩大树冠，幼树多用。此外，为了促进当年新梢生长成熟充实，可在新梢缓慢生长期摘心，可促进花芽分化，有利于果实提早成熟，并能提高单果重。摘心时期一般在7月中旬至8月上旬为宜。

泰安高新区凯欣园艺场13583899905是集引种、繁育、实验、推广、服务为一体化的大型果树绿化苗圃，占地700余亩，在山东果树研究所、农科院专家的指导下，每年繁育及销售全国各地上千万的优质果苗，十几年的产销，品种无一差错。公司一贯秉持着“诚信经营，质优价廉”的服务宗旨，赢得了广大客户和同行的高度信赖。长期供应：[草莓苗],[香椿苗],[花椒苗],[苹果苗],[海棠苗][梨树苗][樱花苗][山楂苗][樱桃苗][桃树苗][枳壳苗][蓝莓苗][板栗苗][杏树苗]等。早实薄皮8518核桃苗，香椿苗上百万株，花椒苗上百万，桃实生苗上百万，草莓苗上百万，欢迎用户前来参观订购。