

玛瑙红樱桃苗一棵多少钱 玛瑙红樱桃苗品种报价

产品名称	玛瑙红樱桃苗一棵多少钱 玛瑙红樱桃苗品种报价
公司名称	泰安高新区北集坡凯欣园艺场
价格	15.00/棵
规格参数	厂家:泰安凯欣园艺场 地径:0.8cm 纯度:98%
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡街道办事处
联系电话	13583899905

产品详情

泰安开发区凯欣园艺场介绍玛瑙红樱桃的树冠紧凑，枝条表面灰白色，直立性强，树势旺盛；叶片椭圆形，叶尖纯尖，叶刻浅，叶色浓绿；花芽侧生，1个花芽内有3~5朵化。总状花序或簇生状花序，花冠白色，雌、雄蕊健全，柱头浅2裂、花粉多；果实椭圆形，果顶略突，颜色紫红色、形如玛瑙，平均单果重4.3g，大单果重6.8g

。玛瑙红樱桃是贵州纳雍县库东关乡独有特产，具有以下特点：果大肉厚，单果重5-7克，是中国大樱桃系列;高产受益长，每亩产量超过2000千克，果树寿命超过20年;成熟期早，玛瑙红为早熟樱桃，比其他中国樱桃早七天左右成熟，是名副其实的第一早春果，在进入市场上占了时间优势;玛瑙红樱桃多汁香甜，含有丰富的营养成分，深受人们喜爱。选择种植玛瑙红，是发展致富的好项目。

主要气象灾害

1 低温冻害

樱桃花期或幼果期，耐低温能力弱，预防霜冻是每年的关键措施。在霜冻来临时。可采用熏烟、建棚等防范措施，减轻霜冻危害。

2 冰雹

冰雹打伤打落果实，使产量和质量明显下降。冰雹还可使树体受伤。易造成流胶病等病害。加大对特色红果林区域炮点的建设，适时开展人工防雹作业，极大地降低雹灾对樱桃的影响。

3 抗旱与排涝

樱桃既不抗旱，也小耐涝，春季干旱会引起早黄落果。秋季干旱会使叶片失绿，甚至使叶片早落，影响越冬和翌年果品产量和质量；要应适时做好灌溉和排涝工作，平稳供水，对减少落花落果和提高座果率等有重要意义。

4 过湿

裂果是影响樱桃品质的一个重要问题，在果实发育期干旱而在成熟期降水，会引起大量的裂果。成熟期要参照天气预报适时搭建临时防雨棚，减少水分与果实的接触，要加强修剪，使树体透光通风，加快蒸发，减少水分在果面驻留的时间。

多年来，良种大樱桃一般采用传统的两年两步法繁育苗木，即第一年繁殖砧木，第二年嫁接品种接穗，最快需两年才能出圃成品苗。为探索育苗繁殖新途径，实现快繁多繁，笔者自2013年开始，分别在山东省平度市的李园街道后戈庄村和东阁街道沟西村，利用“炮捻法”嫁接大樱桃并获得成功，成效明显。笔者嫁接黄蜜、红灯、冰糖樱、美早、大地红、萨米脱等大樱桃品种25000株，成活23800株，成活率达95%，出圃成品苗22600株，成苗率达90%以上。

一、选择砧木

砧木品种选择最为关键，笔者选用的是从威海市经济技术开发区和烟台地区引进的樱砧王，又称冈山16。该品种扦插极易生根，很微小的枝段也能够扦插成活，苗木根系非常茂密，生长迅速。扦插后当年成苗，一般株高0.2米以上，最高可达1.6米，直径1.2厘米以上，最粗的直径近2厘米。

二、适时嫁接

1. 砧木和接穗准备

11月下旬，樱砧王母株全部落叶后，选择一年生、粗0.8~1.3厘米的樱砧王主干部分或粗壮的侧枝，采剪回室内，其间注意防止砧木失水。在室内将枝条剪成长13~15厘米的枝段备用。将落叶后的大樱桃苗木在室内剪成18~20厘米的枝段，保湿储备好。

2. 生根粉浸泡和蜡封处理

嫁接时间为12月上旬至翌年3月上旬。嫁接前将砧木上端、接穗下端3厘米部分用100毫克/升ABT1号生根粉液浸泡2小时，以促进嫁接部位更好地产生愈伤组织。浸泡后取出晾干，立即用石蜡进行蜡封。